كتاب اعمار
الحيوانات

(بسم الله الرحمن الرحيم)

نحمدك يا كريم يا وهاب * يا من قدرت الآجال في ام الكتاب
وسخرت لنا الشمس والقمر لنعلم بهما عدد السنين والحساب
ان في ذلك لذكرى لاولى الالباب * ونصلي ونسلم على من نطق
بالصواب * وآتيته الحكمة وفصل الخطاب * وعلى آله الطاهرين
واصحابه الفاخرين * وبعد فيقول راجي حسن المآب * مصطفى
حسن كساب * هذه رسالة لطيفه * ونبذة منيفة * في اعمار
الحيوانات الاهلية * ينتفع بها سائر البرية * الفها البيطري
الماهر جبرار * وسلك فيها مسلك الاختصار * وترجمها من اللغة
الفرنساوية الى اللغة العربية * المترجم اللبيب محمد افندي عبد
الفتاح مع مصحح مسائلها * ومنقح دلائلها * المفتقر الى رحمة ربه
التواب * مصطفى حسن كساب * فجاءت بعون الله مرتبة
المباني * مهذبة المعاني * وسميتها البهجة السنية * في اعمار
الحيوانات الاهلية * وهذا كله باسعاف الوزير الاعظم * والمشير

كتاب اعمار الحيوانات

(بسم الله الرحمن الرحيم)

نحمدك يا كريم يا وهاب * يا من قدرت الآجال فى ام الكتاب وسخرت لنا الشمس والقمر لنعلم بهما عدد السنين والحساب ان فى ذلك لذكرى لاولى الالباب * ونصلى ونسلم على من نطق بالصواب * وآتيته الحكمة وفصل الخطاب * وعلى آله الطاهرين واصحابه الفاخرين * وبعد فيقول راجى حسن المآب * مصطفى حسن كساب * هذه رسالة لطيفه * ونبذة منيفة * فى اعمار الحيوانات الاهلية * ينتفع بها سائر البرية * الفها البيطرى الماهر جيرار * وسلك فيها مسلك الاختصار * وترجمها من اللغة الفرنساوية الى اللغة العربية * المترجم اللبيب محمد افندى عبد الفتاح مع صحح مسائلها * ومنقح دلائلها * المفتقر الى رحمة ربه التواب * مصطفى حسن كساب * فجاءت بعون الله مرتبة المبانى * مهذبة المعانى * وسميتها البهجة السنية * فى اعمار الحيوانات الاهلية * وهذا كله باسعاف الوزير الاعظم * والمشير

الانجم * من اطلعه الله بدرا فى افق المعالى * وغرة فى جبهة الايام والليالى ذى المقام العلى * والفخر الجلى * افدينا الطاح محمد على * ايد الله دولته * وايد صولته * وجعل مقام ابراهيم حرما آمنا لسائر البريه وعباس باسه ملجأ للرعيه آمين هذا وقد رتبها مؤلفها على ابواب وفصول وتذييل

الباب الاول فى عمر الفرس وفيه فصول

كان الاقدمون لا يعرفون من الحيوانات الا الحيوان الذى بلغ من العمر ثمانى سنوات فاقل ومتى جاوزها جهلوا عمره ولم يعرفوه معرفة حقيقية كما كان عليه ارسطاطاليس ووارن وكولوميل وابسرت وفجيس وغيرهم من المتقدمين ثم ان المعلم روزبوس والمعلم تكه والمعلم روبين والمعلم جارزونى والمعلم سولبزيل اضافوا شيأ يسيرا متعلقا بتركيب وتكوين وبروز ومسح الاسنان اما المعلم جرينيل والمعلم جرسول والمعلم بوفون والمعلم بورجلا فقد اثبتوا خطأ بعض الاراء ورفضوه ولم يتمسكوا بالعلامات الصادرة من ثنيات الجلد ولا العلامات الصادرة من عقد الذنب بل اقتصروا على البحث عن الاسنان ومع ذلك كله لم يذكروا شيأ جديدا وانما كانوا متمسكين بقاعدة كقاعدة السماسرة التى ورثوها عن آبائهم واجدادهم

ولما اطاع المعلم لافوس على مازعمه المعلم روبين من ان الاضراس الثلاث الاول تزول ويخلفها مثلها واثبت انمساح الاسنان بادلة علم ان هيئة الاسنان القواطع تتغير باعتبار عمر الحيوان فيعلم منها حينئذ اعمار الحيوان المختلفة لكن لم يوضح هذا المعلم هذه القضية وانما ذكرها اجمالا فى تأليفه حتى ان بعضهم

لم يلتفت اليها الجهلهم بها فيا ليته بينها واوضحها لتتمسك بها الاطباء

ثم انه لما ظهر تاليف المعلم يسنا المشتمل على توضيح الهيات المختلفة التي تعترى تلك الاسنان علم منه ان مؤلفه متمسك برأى مخالف لرأى المعلم لافوس وهو ان هذه الهيات لا تتغير ابدا بحسب الاعمار بل تستمر كل هيئة على ماهى عليه فى زمن معين وهذا خطأ ومع ذلك لا يوجد اعظم من هذا التاليف بالنظر لاعمار الحيوان وان كان مجهولا عند باطرة فرانسا فان مؤلفه ذكر فيه تجربات كثيرة وقواعد شهيرة متعلقة بهذا الفن بعضها سديد وبعضها شاذ من مخترعاته وهذا لا يقدح فيه وقد ذكرت حواجز الاسنان القواطع فى صحيفة وارسلتها الى المعلم تيسيه ونبيت عليها ملحوظاتى المختصة بهذا المؤلف الذى اظنه احسن المؤلفات الموجودة فى عصرنا هذا ثم ان الملحوظات المذكورة وان لم تكن كافية الان فى المقصود قد تنفع فيما بعد

الفصل الاول فى وصف الاسنان

لا شك ان الاسنان آلات المضغ وانها اجزاء عظمية الشكل صلبة جدا منغرزة فى اسخمتها انغرازا عميقا وشاغلة لجميعها وبارزة فى الخارج لتنضم عليها بسفلاها وشبيهة بالثنايا القرنية من حيث تركيبها وبالعظام من حيث خواصها الطبيعية والكيماوية وانها مصفوفة فى حافة اسخمة الفكين على هيئة خط منحن يسمى القوس السنى واعلاه اطول واعرض واقوى من اسفله وان كل قوس من قوسى الاسنان العليا والاسنان السفلى مشتمل على صفين من الاسنان ومقطوع من ربعه المقدم ومنضم

احدهما الى الآخر من اسفلهما على هيئة نصف دائرة
وعدة اسنان الفرس ست وثلاثون فاكثر الى اربع واربعين بعضها
يسمى قواطع لكونه يقطع الاغذية وبعضها يسمى زوايا
اوكلاليب اوانيابا اومزقا لكونه يمزق الاغذية اذا كان من اسنان
حيوان يغتذى من اللحوم وبعضها يسمى اضراسا لكونه يهرس
الغذاء كالطاحون ثم ان جميع الاسنان تنمو فى باطن الفكين ثم
تبرزهما بعدان تكتسب نوعا من الطول والغلظ وبعدان يبرى
ويزيل السطح الظاهر من اسنتها وبعضها يبرز بعد الولادة بمدة
يسيرة فيسمى حينئذ بالاسنان اللبنية اوالاسنان الجنينية
والاحسن تسميته بالاسنان المثغورة لكونه يسقط حين بلوغ
الحيوان وهذا البعض هو الاسنان القواطع والاضراس الثلاث
الاول والبعض الاخر الذى يتاخر نموه يسمى بالاسنان المستمرة
ثم ان الاسنان التى تخلف الاسنان المثغورة وتشغل محلها تسمى
بالاسنان البدلية

بيان الاسنان القواطع

هى ست مكونة للطرف المقدم اوالاسفل من كل فك وبانضمام
بعضها الى بعض فى الحيوان الحديث تصير نصف دائرة منتظمة
ثم تصير غير منتظمة اذا صار الحيوان كهلا والثنتان المقدمتان
منها وهما الوسطيان تسميان بالثنيتين اوالقارصتين لكونهما
تقرصان الاغذية باعتبار وضعهما والثنتان اللتان بجوانبهما
تسميان بالرباعيتين والثنتان الاخيرتان اللتان هما نهاية الدائرة
تسميان ناجذتين اوزاويتين ثم ان جميع الاسنان القواطع البدلية
التى لسن البلوغ متى تم نموها ولم يذب منها شئ بل استمرت كاملة

بكسر الشوهد فى كل سن منها جزأن احدهما منطلق والآخر ثابت فالمنطلق بارز بمقدار ستة خطوط من فوق حافة اللثة ومفرطح من الامام الى الخلف على هيئة مخروط اصله مكون للطرف المنطلق من السن وطرفه فى جهة الحافة السنخية فهذا الانتظام جعل الاسنان القواطع لا تتلامس الا باطرافها المنطلقة اما الطرف المقابل للجذع ففيه مسافة مشغولة باللثة والحواجز السنخية

والسطح المقدم او الظاهر قليل التقبب فى طوله تلم او تلمان عميقان واضحان فى الثلث الاعلى اكثر من وضوحهما فى الثلث الاسفل وهذا امر اغلبى ويزدادان وضوحا فى بعض ازمنة من عمر الحيوان والسطح المؤخر او الباطن (صفحة ١ شكل ١١) قليل التقعر منخفض من جهته الوحشية واقل امتدادا من السطح المقدم ومتى برزت السن صار هذا السطح كارزة صغيرة موضوعة فوق اللثة ويصير طوله فى الفرس الكبير كطول السطح المقدم فى بعض الاحيان وهو منقسم فى معظم الاسنان قسمين متساويين بتلم عميق جدا لاسيما فى النواجذ وهذا التلم ممتد من الاسنخة الى الحافة المؤخرة التى للسن

والطرف المنطلق (شكل ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الذى تتلامس به اسنان الفكين وتتحاكك قد يشاهد فيه سطح عريض مفرطح من الامام الى الخلف يسمى باللوح السنى الذى هو فى الاسنان السليمة مشتمل على تجويف عميق مستطيل من احد جانبيه الى الآخر ثم يملىء مادة صفراء ثم مادة سوداء تسمى عند قدماء البياطرة بيذرة حبة الفول ويشتمل ايضا على حافتين حادتين

محيطتين به تنضم احداهما الى الاخرى بجوانبه على هيئة زاوية حادة فالحافة المقدمة منهما اكثر امتدادا وارتفاعا من الحافة المؤخرة التى فى وسطها حفرة عميقة هى فى الحقيقة وصلة من التلم الذى فى السطح المؤخر * ولا ينبغى ان يسمى السطح الحالك الذى للسن باللوح الابعدان يفسح نوع افساح بحيث تكون حافته المقدمة مساوية لحافته المؤخرة فحينئذ لا يبقى من التجويف السنى الا شئ يسير مكون للسطح المذكور لكون هذا التجويف موضوعا فى وسط ذالك السطح وملتف بنوع قرطاس وكلما تقدم الحيوان فى العمر ضاق التجويف المذكور حتى يزول بالكلية والواقع ان جسم السن يتغير كتغير القرطاس السنى الا انه ابطأ منه ويتضح تغيره حين يصير القرطاس نقطة مستديرة وقرب اوان انمساحه * وهيئته كهيئة المخروط * والضيق الذى فى الجهة المستورة باللثة واضح جدا فى الاسنان القواطع التى للثور والقواطع المثغورة القديمة التى للفرس فمن هذا الضيق ترى الاسنان مختلفة من جهة الحافة السنخية

والحافتان الجانبيتان اللتان للجزء المنطلق من الاسنان القواطع احداهما باطنة والاخرى ظاهرة فالباطنة مقابلة للسطح المتوسط ومستديرة وامخن من الحافة الظاهرة التى هى فى الغالب رقيقة حادة لاسيما فى النواجذ ثم ان هاتين الحافتين تنحنيان فى الحيوان الحديث بحيث تمتد الحافة الظاهرة الى الامام وتلتصق بالحافة الباطنة * والواقع ان هذا الانحناء ناشئ عن كيفية نمو الاسنان القواطع التى تظهر فى الغالب مثنى معترضة ولا تصير خطا واحدا مستويا الا بعد مدة ولا يزول

الا ضحناء المذكور الا اذا بلغ الحيوان من العمر ثماني سنوات
والجزء المنحصر في السنخ المسمى في الغالب بجذر السن مفرطح
تفرطحا شديدا في باطن السنخ الفكي ومائل الى الخلف ظاهره
مقبب تقبيبا شديدا وهو منتهيه بطرف غير قاطع وموازلمحور
الفك من الاسنان القواطع ومنحرف في الاسنان الرباعية واشد
انحرافا في النواجذ ولاشك ان القوس الناشئ عن جذور هذه
الاسنان اضيق من الجزء المنطلق واقل تحيزا منه
ويختلف طول وهيئة وقدر ذلك الجزء باختلاف عمر الحيوان
وهو مشتمل على بعض تغيرات مهمة ينبغي لنا ان نذكرها
فنقول انه حين ظهور الاسنان يكون في الغالب قصيرا مستديرا
مجوفا ولا يمكث تجويفه الباطن الذي جدرانه رقيقة الامدة
يسيرة وليس محتويا على جراب مخصوص كالجراب الذي
في التجويف الظاهر وهو غير ممتد في باطن الجزء المنطلق ومحيط
بالقرطاس السني الظاهر ومحتو على جوهر لبي يرى في الغالب
انه المركز الحيوي والغذائي الذي للسن * وكلما تقدم الحيوان
في العمر نقص التجويف الجذري المتقدم ويبتدي انسداده من
الحافة الباطنة التي للسن الى قعره ويستطيل هذا التجويف
ويغور ثم يستدير ثم يتثلث ثم يتفرطح من احد جانبيه الى الآخر
ثم يزول بالكلية فيصير الجذر حينئذ دقيق الطرف ويبطل نموه
بالكلية
وطول جميع الاسنان القواطع المثغورة مقدار خمسة عشر خطا
فاكثر الى عشرين وطول الاسنان القواطع البدلية مقدار
اثنين ونصف فاكثر الى ثلاث وهيئتها مختلفة فسطحها الحالك

مفرطح من الامام الى الخلف وجزءها الملامس للحافة السنخية ضيق * وجذرها يضى الشكل ثم يستدير ثم يتثلث ثم يصير طرفها مفرطحا من جهة الى اخرى وهذا الاختلاف واضح فى الثنايا والرباعية اكثر من وضوحه فى النواجذ وان اردت الوقوف على ذلك فخذ سنا من الاسنان القواطع وانشرها بمنشار واجعل مابين كل نشرين مقدار خطين كما هو مذكور فى صفحة ٣ شكل ١٠) وقد تختلف الاسنان القواطع من حيث طولها وهيئتها وعمق تجويفها * والغالب ان النواجذ اقل طولا من الثنايا والرباعية وليست منتظمة كانتظامها بمعنى ان بيضيها ومستديرها ومثلثها اقل وضوحا من بيضى ومستدير ومثلث تلك وقرطاسها السنى اقل عمقا من قرطاس تلك ومتى تم بروز الاسنان القواطع صار طول هذا القرطاس فى الاسنان السفلى مقدار ستة خطوط او سبعة وفى الاسنان العليا ضعفها ومتى بلغ الفرس ست سنوات صار طول القرطاس السنى الذى للثنايا السفلى مقدار ستة خطوط فاكثر الى سبعة وطول القرطاس الذى للرباعية سبعة خطوط فاكثر الى ثمانية وطول القرطاس الذى للنواجذ مقدار خمسة خطوط فاكثر الى ستة وطول القرطاس الذى للثنايا العليا مقدار احد عشر خطا فاكثر الى اثنى عشر وطوله فى الرباعية مقدار اثنى عشر خطا فاكثر الى ثلاثة عشر وطوله فى النواجذ مقدار ثمانية خطوط فاكثر الى تسعة

ولا شك ان الاسنان القواطع العليا اقوى واكبر واوضح من الاسنان القواطع السفلى فلهذا تجد الحافة الظاهرة التى

للنواجذ السفلى متكئة على وسط السطح الذى للنواجذ العليا فتذوب من هذا الاتكاء وينشأ عن ذوبانها شرم مثلث يمكن الطبيب ان يستدل به على عمر الحيوان ولا يحصل الا اذا بلغ الحيوان سبع سنوات ثم يزول مع تقادم الزمن ولا يزول بسرعة الا اذا كان الفك افقى الاتجاه

والاسنان القواطع المثغورة اعرض من الاسنان البدلية فى الغالب واقل طولا منها وتكون فى ابتدآئها بيضاء سنجابية وسطحها الظاهر مستور بالام صغيرة قليلة العمق والثلم الذى فى سطحها المؤخر قليل الوضوح * ومتى تقدم الحيوان فى العمر وقرب سقوطها صار سطحها الظاهر لامعا املس كما هو فى الاسنان البدلية وابدات الالام المذكورة بالام قليلة العمق وتباعدت تلك الاسنان بعضها عن بعض وضاق اصلها الذى هو جذرها ولا يوجد هذا الضيق فى الاسنان البدلية ولو بلغ الحيوان من العمر ما بلغ (صفحة ١ شكل ١١ و ١٢

الفصل الثانى فى الاضراس

هى اربع وعشرون ضرسا فى كل فك اثنا عشر ستة يمنى وستة يسرى وكلها متقاربة وثابتة فى اسنختها ومكونة لفروع القوس السنى اوجوانبه وطول الضرس الاول فما بعده من كل جهة من جهتى الفك الاعلى الى اليها مقدار اربع اباهم وطولها فى الفك الاسفل اقل من ذلك ثم ان الاضراس الثلاث الاول من اضراس كل جهة قد جعلها ارسطاطاليس وبوفون وبورجلا ودوبانتون مستمرة لا تسقط مادام الحيوان حيا وقال المعلم روبين فى سنة ١٥٩٨ ان الثنتين منها تسقطان واستمر العمل بهذا

القول

القول الى ان ظهر الحكيم تينوفا ثبت ان تلك الاضراس الثلاث تسقط ويخلفها مثلها

ولكل ضرس من اضراس الحيوان الكبير جزءآن احدهما منطلق والآخر ثابت فالمنطلق محدب الظاهر والبارز منه مقدار ستة خطوط وسطحه الظاهر المتجه اتجاها عموديا محتو على تلمين مستطيلين فى اضراس الفك الاعلى والغالب ان يزاد عليهما تلم فى الضرس الاول البدلى فيصير فيه ثلاثة اتلام ويزيد عمقها فى الضرس السادس ويزول منها واحد فيبقى اثنان فقط وليس فى كل ضرس من الاضراس السفلى الا تلم واحد عميق يمتد حتى يصل الى محل شعبتى الجذر وسطحه الباطن اقل ارتفاعا من الظاهر فى اسنان الفك الاعلى واكثر ارتفاعا منه فى اسنان الفك الاسفل اما الاسطحة الجانبية فمستقيمة وملتصق بعضها ببعض

والسطح الحالك من السن السليمة مركب من اشرطة صغيرة منحنية الانحناء كثيرا وبين كل حنيتين تجاويف تزداد عرضا وعمقا مادامت السن صغيرة وهذه الاشرطة المحيطة بهذه التجاويف تصير حادة مادامت السن غير متحاكة ولا شك ان هذا الانتظام مسهل لبروز الاسنان من حافات انسختها الا محالة ومتى انمسحت الاضراس تغيرت هيئتها فصارت حافاتها الظاهرة غير حادة وتجاويفها مختلفة متسامتة بحسب الظاهر واسطحتها المتحاكة مفرطحة مختلفة ذات اربع زوايا ومنحرفة الاتجاه انحرافا خفيفا من الباطن الى الظاهر فى الفك الاسفل ومن الظاهر الى الباطن فى الفك الاعلى * وهذه الاسطحة مشحونة بارتفاعات

صغيرة وانخفاضات معترضة منتظمة متساوية لتحاكى
الاضراس بعضها بعض
وجذر كل ضرس غائر فى قعر سنخه ويختلف طوله وانتظامه
باختلاف الاسنان فلهذا كان الضرس الثالث والخامس اكبر
من بقية الاضراس ويستمران على طولهما وانتظامهما الى ان
يموت الحيوان كما قاله المعلم تيتوه * وهما فى الفك الاعلى اقوى
من مثلهما فى الفك الاسفل وفى جميع امتدادهما الارتفاعات
والانخفاضات المتقدمة
وجذر الضرس الاول متجه الى الامام وجذر الضرس الثانى
والثالث مستقيمان وجذور الاضراس الثلاثة الاخيرة متجهة
الى الخلف واطراف جذور الاضراس مشتملة على تجاويف
عميقة تتصالب مع التجاويف الظاهرة بدون اتصال وكلما كان
الحيوان صغير السن كانت هذه التجاويف عميقة جدا لاسيما
فى الاسنان القواطع ومتى بلغ الحيوان اربع سنوات او خمسا
خرج من كل جذر من جذرى الضرس الثالث والسادس من
الاضراس العليا ثلاثة جذور ومن جذرى الثالث والسادس
من الاضراس السفلى اربعة جذور ويصير الضرس الاول
والضرس الاخير من الاضراس السفلى مشتملين على ثلاث
شعب ويصير الاول والاخير من الاضراس العليا مشتملين على
شعبتين وقد تكون الشعبتان فى الضرس الاول فقط * وقد يوجد
فى كل فك ضرسان زائدتان شبيهتان بالضرس الاولى من
اضراس الكلب وهما موضوعتان امام الضرس الاولى التى
ستسقط وتشبهان الضرس الاولى البدلية فى العرض وتظهران

عقب سقوط الضرس الاولى الآيلة الى السقوط ويندر
وجودهما فى الحيوان الذى لم يبلغ من العمر سنتين ونصفا بل
لا توجدان فى الغالب ابدا * ولا شك ان الاضراس العليا
كالاسنان القواطع العليا فى ان كلا منهما اقوى واكبر من
الاسنان السفلى وان قوسهما التى اعرض ثم ان انتظام
الاسنان القواطع مخالف لانتظام ووضع الاضراس فان كانت
هذه الاضراس متلامسة كانت القواطع متباعدة وعكسه
وهذا امر ضرورى فان بعضها يتحرك من الامام الى الخلف
وبعضها يتحرك تحركا جانبيا

الفصل الثالث فى الانياب ويقال لها الكلاليب

سميت بالكلاليب لكونها اشبه بانياب الخنازير الوحشية وهى
موضوعة بين الاضراس والقواطع ثم ان النابين الاسفلين
قريبان من النواجذ السفلى وان النابين الاعلوين بعيدان عن
النواجذ العليا بمقدار ابهام ونصف تقريبا فينشأ عن هذا
الانتظام المشابه لانتظام كلاليب الحيوان الذى يغتذى من
اللحوم عدم تحاكك هذه الكلاليب وانما تتصالب عند تقارب
احد الفكين من الآخر

والجزء المنطلق من الاسنان المذكورة مخروطى الشكل اصله
قريب من السنخ وسطحه الظاهر مقبب مشتمل على خطوط
وفى وسط سطحه الباطن ارتفاع مخروطى محدود بتلمين عميقين
متقاربين من افراطهما ومنفرجين من اصلهما والجزء المنحصر
فى السنخ المتجه نحو الخلف اتجاها مطابقا لاتجاه جذور النواجذ
تحت طرفه على فم تجويف مستطيل واصل الى الطرف

المنطلق من السن الحديثة وكلما تقدم الحيوان فى العمر انسد هذا التجويف من قعره الى فمه فينقص حينئذ سمك الجذر ويزيد طوله ويصير كانبوبة من زجاج ممتدة مع الرقة كامتداد الزجاجة على المصباح ثم يزول التجويف بالكلية

والكلاليب كلها متساوية غير ان كلاليب الفك الاسفل اطول واقوى من كلاليب الفك الاعلى وهذه الكلاليب مختصة بذكور الخيل لان اناثها خالية عنها وان وجدت فيها كانت قليلة نادرة ولو ظهرت وكبرت لم تشتبه بكلاليب الذكور لكونها خالية عن البارزة والتلمين التى فى السطح الباطن من كل كلاب من تلك وظن بعض الاقدمين ان الفرس المشتملة على شئ من هذه الكلاليب عقيم وان الحصان الخالى عنها كذلك وهذا الظن خطأ

واعلم ان الخصى لا يؤثر فى حجم الكلاليب المذكورة ولا فى قوتها ولا فى مدة بروزها المجهولة * واتفقت كلمة القوم على ان الكلاليب مستمرة لا تسقط مادام الحيوان حيا لكن لا ينبغى اخذ الكلام على اطلاقه فان الحكيم فورلوم الذى هو حكيم اول فى الاداى السادس من الآيات الفرسان قدم لنا فكين محتوين على كلاليب لبنية واضحة جدا خلفها كلاليب بدلية ولا شك فى صحة ذلك لان هذين الفكين موجودان الآن فى مدرسة الفور * ومن المهم لنا ان نعرف هل الانياب البدلية كثيرة الوجود يمكن ظهورها او نادرته كما شوهد فى النواجذ اللبنية التى لذوات الصوف فانها فى هذه الحيوانات لا تخلف بعد سقوطها هذا وقد قال الحكيم الماهر بجو المعلم الثانى فى مدرسة الفوران حصول

الانياب البدلية ليس نادرا بل هو كثير كما يدل له ماشاهده المعلم المذكور في مهار بلغت من العمر ثلاث سنوات او اربعا ثم ان ابحاثنا واجتهادنا في هذه الانياب التي للحيوانات الحديثة الحية والميتة لم تثبت لنا الامثالا واحدا كالمثال الذي ذكره الحكيم فورلوم وهو انه وجد في بعض المهار ناب لبني مستطيل كالابرة لايشبه الانياب المذكورة وليس مستمرا بل يسقط بسرعة قبل ان ينمو كنمو سائر الكلاليب

الفصل الرابع في تركيب الاسنان

الاسنان مركبة من جوهرين رئيسين مختلفي اللون والصلابة والوظيفة احدهما ظاهر يقال له طلائي والآخر باطن يقال له عند العوام عظمي والاحسن تسميته بالعاجي كما قاله المعلم اونتير والمعلم كوفيه لانه في الواقع ليس عظميا اذ ليس مكونا من ماتكونت منه العظام وانما يشبهها في التركيب الكيمياوي بل بينه وبينهما اختلاف فيه ايضا كما ذكره المعلم مورچني والمعلم بيرزيليوس فانهما اثبتا ان هذا الجوهر مشتمل على كمية قليلة من قلويات الكلس ثم ان الجوهر العاجي سار في جميع امتداد السن وجزءه المنطلق مستور بالجوهر الطلائي ومكون للجذر وهو ابيض مائل للصفرة صلب جدا مكون من خطوط معترضة بالنسبة لمحور السن فلهذا اكتسب هيئة الحرير

واذا حقن حقنا دقيقا جيدا لم يظهر في باطنه اوعية لكن يمكن وجودها فيه قائنا نعرف بواسطة الغمس ان المائعات تنفذ في بواطن الطبقات العميقة منه كما تنفذ في السطح الباطن من القرن ومما يثبت ذلك ايضا نفوذ المادة الحمراء في بواطن الطبقات

الباطنة التى للجوهر العاجى الذى لسن الحيوان الذى يغتذى من القوة فى مدة نموه وهذا انما يثبت التجربات الجديدة التى للمعلم ماجندى والمعلم فودره اللذين اثبتا ان فعل الامتصاص ليس الاتشربا فى جميع الاحوال

ثم ان الجوهر العاجى الذى للاسنان القواطع الحديثة يمتد حتى يصل الى طرف الجذر ثم يتباعد عنه حين امتداده وبروز السن فى الخارج

والجوهر الطلائى قشرة موضوعة فوق الجوهر العاجى وهو ابيض لبنى اشد ملاسة ونعومة فى الاسنان البدلية منه فى اسنان الحيوان الحديث وفيه صلابة شديدة حتى انه يتحمل القدح بالزند ولا يقبل الحفر بالكلية * وتركيبه الكيماوى مخالف لتركيب الجوهر العاجى * ومعظمه مكون من فوسفات الكلس ومحتو على مادة قليلة حيوانية وهى جزء آن من مائة كما قاله الحكيم بيرزيليوس ومقدارها فى الجوهر العظمى السنى ثمانية وعشرون جزأ فاكثر الى ثلاثين جزأ * وباطن السن محتو على تجويف متصل بقعر السن بواسطة بقوة فى طرف الجذر تتناقص كلما تقدم الحيوان فى العمر ومثلها التجويف المذكور الذى هو ممتلىء مادة هلامية سنجابية هى فى الواقع زغبة واحدة منتفخة صادرة من الغشاء الخاطى الفمى وملفوفة بغشاء وعائى عصبى غير نافذ فى باطن الجوهر العظمى

وانتظام الجوهر العاجى مخالف لانتظام الجوهر المذكور فى جميع الاسنان وهيئته فى الاضراس مخالفة لهيئته فى الانياب وهيئته فيها مخالفة لهيئته فى الاسنان القواطع ونحن نقتصر على

هيئته فى هذه الاسنان لانها المقصودة لنا

واعلم ان الجوهر الطلائى ينثنى فوق السطح الحمائى بعد ان يستر جميع السطح الظاهر من الجوهر العاجى ثم يدخل فى باطن السن فيكون هنالك تجويفا مخروطيا يضيق ويقرب من الحافة المؤخرة من السن كلما قرب من الجلد ثم ان استطالة الجوهر الطلائى يعتبر فيها جزءآن احدهما التجويف الذى احدثها فى الظاهر والآخر القرطاس المحيط بهذا التجويف الذى تسهل رؤيته حين قطع السن قطعا مختلفا وهو محيط فى السن الصغيرة بالتجويف اللبى المتصل بالطرف المنطلق ويكثر وجوده فى الجهة المقابلة للحافة المقدمة من السن (صفحة ١ شكل ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦) وكلما تقدم الحيوان فى العمر انسد ذلك التجويف وصار القرطاس السنى محاطا بالجوهر العاجى فقط الذى يزداد تخنا فى الجهة المقدمة اكثر من ازدياده فى الجهة المؤخرة (صفحة ١ شكل ٧ و ٨ و ٩ و ١٠) وذكرت انا والمعلم تينو والمعلم كوفيه ان هنالك جوهرا ثالثا سنيا سمى بالجوهر القشرى وهو سائر للجوهر للطلائى اسود واقل صلابة من الجوهرين المتقدمين ومكون فوق الاسنان القواطع الحديثة دهنا يزول بسرعة حين تحاككها بلوحها السنى * وهذا الجوهر مادة سوداء يسمى عند العوام ببذرة حبة الفول ويشبه المادة القوية السائرة لاصل جذر سن الادمى وهو مكون للطبقة السوداء السائرة لاسطحة اضراس الحيوان المجتر * وشاغل للثنيات التى لالواح اضراس الحيوان الذى يغتذى من الحشيش

وقد تقدم ان الاسنان منغرزة فى اسخفة الفكين وان سرعة نموها

وبطوه يختلفان باختلاف الحيوان ثم ان اجنة الخيل التي مضى عليها في بطون امهاتها ثلاثة اشهر لم يخلق لها شيء من الاسنان وانما في بواطن فكوكها تجاويف صغيرة تصير فيما بعد اسنخة وهي محتوية على فقاقع ليست الاصول الاسنان ثم يشاهد على طرف كل منهما من جهة السنخ في الشهر الرابع والخامس من مدة الحمل طبقة او طبقات من جوهر عظمي ينضم بعضها الى بعض فيصير بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا وهي التي تشاهد على لوح الاسنان ثم تثخن بانضمام طبقات جديدة اليها من سطحها الباطن وتظهر طبقات أخر على جوانبها وهذا النمو يحصل دائما من الجهة لظاهرة لتبرز السن في الخارج بحيث يكون جذرها آخر ما يتكون منها ثم ان صفائح الجوهر العاجي تكون اقصر من غيرها في الطرف السني فينشأ عن ذلك ان الجزء اللبي يتناقص كما غلظت السن وتستمر هذه الكيفية مدة حياة الحيوان ثم يزول هذا الجزء بالكلية لاهمالة ولا يبقى لتجويفه اثر البتة

وليس نمو الجوهر الطلائي كنمو الجوهر العاجي لانه لم يتكون من طبقات جديدة صادرة من الباطن الى الظاهر بل يتفرز من الغشاء الساتر لجدار السنخ ثم يستر الجوهر العاجي الى ان يصل الى طرف السني ومتى تكون الجوهر العاجي استمر تخنه على حال واحدة ولم يتغير وقد يشاهد الجوهر الطلائي مشاهدة تامة في الاضراس الحديثة ملتصقا بهذا الجوهر على هيئة صفائح متوازية بالنسبة لمحور السن تشبه صفائح النسيج الشبكي الذي للسطح الباطن من قدم الترس ولا تحصل على صلابتها الا قبيل

بروزها وتبتدى هذه الصلابة من اول الحافة السنخية ولا يدخل
فى الجوهر الطلائى اوعية قط وهو مخالف للجوهر العاجى
غاية الخلاف فلا يزداد تخننا فى مدة حياة الحيوان ولا يتلون
بالحمرة الناشئة من تناول النبت المسمى بالفوة ولا يمكن التحام
ما تفتت منه بخلاف الجوهر العاجى فانه اذا كسر تجدد بواسطة
طبقات جديدة وليس ذلك الجوهر مركبا من فولوات الكلس
بخلاف هذا الجوهر وقد يحل معظمه فى حمض ممزوج بماء
بخلاف الجوهر العاجى فانه وان انحل فيه يستمر على هيئته
ويصير شفافا مرنا

وليس لحصول الفقاقع السنية وتعظمها مدة معلومة فى جميع
الحيوانات ففى جنين الفرس الذى مضى عليه فى بطن امه اربعة
اشهر فاكثر الى خمسة اثنا عشرة فقاعة سنية نحيفة اخذت
فى التعظم منها ستة للاضراس وستة للقواطع وفى هذه المدة
تكون النواجذ قليلة الظهور وكلما تقدم الجنين فى النمو وقرب
خروجه من بطن امه ازداد تعظم تلك الفقاقع بمعنى انه متى بلغ
من العمر تسعة اشهر صلبت الاسنان وتعظمت النواجذ
وتميزت جميع فقاقع الاسنان الآيلة للبروز ولم تزل الاسنان تنمو
من جميع الجهات فتتباعد جدران اسنختها ثم تزداد كبرا وحجما
بحيث تضيق عنها هذه الاسنخة فتثقب ارق اجزاء السنخ وهو
الجزء المقابل للفم اعنى الحافة السنخية التى للفك فحينئذ تثقب
السن الصفيحة العظمية واللثة الساترة لها

ومتى تم بروز السن استمر نموها طولا من جهة الجذر ومدة هذا
النمو فى غير مشقوق الحافر اطول منها فى الحيوانات الكبيرة

التى تغتذى من الحشيش وينشأ عن نموها المذكوران جدار السنخ يسترق ثم يتجدد وان الجزء السنى الذى كان مكونا للجذر يصير مكونا للوح السنى بعد مضى ست سنوات ومن نمو الاسنان القواطع اتخذ المعلم ينو والمعلم لافوس والمعلم يسنا قواعد يعرف بها عمر الخيل التى بلغت من العمر سبع سنوات اوثمانى وهذه القواعد احسن واقوى واتم من القواعد التى ذكرها المعلم بفون والمعلم ديانتو والمعلم بورجلا وغيرهم وقد ذكرنا انه متى برزت سن من الاسنان القواطع ولم تحك كان طرفها المنطلق مفرطحا من الامام الى الخلف وكانت من اسفله بخطين بيضية الشكل ومن اسفل ذلك بخطين ايضا مستديرة ومن اسفل ماذكر مثلثة ومن اسفل ذلك مفرطحة من احد جانبيها الى الآخر ومتى تحاككت هذه السن واشتملت على هذه العلامات التى تكون السطح المحالك عرف منها عمر الحيوان معرفة تامة لاسيما الحيوان العتيق ومثل هذه السن تجويفها فانه يضيق ثم يصير بيضى الشكل ثم يصير مثلثا فاذا زال بالكلية خلفه الدرب غير النافذ الذى للقرطاس السنى ولاتظن عدم مطابقة الاسنخة للاسنان موجبا لبروزها فى الخارج بل متى اخذ السنخ فى الانسداد وبطل نمو جذر السن ازداد نمو عظام الفك ودفعت الاسنان الى الخارج وانسداد السنخ بالكلية ولاشك فى تأثير الفكين فى الاسنان كما يشاهد فى هيئة رأس واسنان الحيوان الكهل وتقدم ايضا ان السطح المحالك الذى للاسنان القواطع عريض جدا وان جزءها المتغرز فى السنخ ضيق ومتى تقدم الحيوان فى العمر صار هذا الجزء مكونا للسطح المحالك فحينئذ

تكون

تكون السن مستوية الاجزاء فى العرض فيؤخذ من ذلك ان
الاسنان القواطع التى للفرس تصير متباعدة كالاسنان القواطع
التى للثور وليس الامر كذلك بل هى متقاربة وتقاربها ناشئ
عن تأثير الفكين فيها

وتعسر معرفة مقدار ما يبرز من الاسنان القواطع فى كل سنة
وذكر المعلم بيسنا ان مقدار ما يتحاكك من اسنان الخيل
الجيدة خط ومن اسنان الخيل الدنية خط ونصف وحيثما كان
طول الاسنان متحدا فى معظم الخيل كان بروزها بحسب
ماذاب منها فى كل عام فان نقص من الاضراس ضرس اكتسب
الضرس المقابل له طولا عظيما فعلم من ذلك ان تحاكك السن
ليس موجبا لبروزها بل تبرز بنفسها وله شواهد كثيرة

ثم ان الحكيم تينو قد حسب مقدار ما يبرز من اضراس الفرس
فوجده فى الضرس السليمة ست اباهم ووجد فى رأس فرس
قد ذبحت للتشريح فى سنة ١٨٠٥ مسيحية وكان عمرها ست
سنوات اوسبعا ان الاضراس العليا التى فى الجهة اليمنى لم يذب
منها الا اسطحة جوانبها الباطنة ولم يذب شئ من اسطحة
جوانبها الظاهرة وان الاضراس السفلى ثقبت سقف الحلق
لشدة بروزها وان الاضراس العليا اكتسبت طولا شديدا فبلغ
طول احدها مقدار خمس اباهم من ابتداء طرف جذره الى
آخر لوحه وكان طول باقيها اقل من ذلك بمقدار خطين انتهى
ماذكره الحكيم المتقدم

وجميع ماذكرناه مختص باسنان الحيوان البالغ وهى الاسنان
المستمرة مدة الحياة وتسلك الاسنان اللبنية فى اسنخها

وهذا كله دليل على وجود كل من الاسنان اللبنية والاسنان البدلية فى زمن واحد الا ان بروز الاسنان البدلية بطيء وهى مكونة من صف فقاقع موضوع اما فوق الاسنان اللبنية واما خلفها واما تحتها ومشتملة على ما اشتملت عليه الاسنان اللبنية * والواقع ان تلك الفقاقع فى قعور الاسنخة وانها تتقارب بالتدريج من الحافة السنخية ثم تتعظم ثم تتقارب الحاجز الذى بينها وبين الاسنان اللبنية فتتلف جذورها وتضغط اوعيتها واعصابها ثم تسقطها فمتى اسقطتها برزت ولا تظن ان الاسنان تقتحك فقط بل تمص ايضا من جذورها لاسيما الاسنان اللبنية وهذا شئ ظاهر كما يشاهد فى الاضراس حين سقوطها لانها تصير فى هذه الحال على هيئة صفيحة صغيرة * ولما كانت الاضراس البدلية تبرز من تحت الاسنان اللبنية ومن فوقها بدون حائل سهلت معرفة سقوط هذه الاسنان ولا يوجد هذه الكيفية فى الاسنان القواطع لانها اعرض من تلك وموضوعة خلفها بدون ان يتصل بعض اطرافها ببعض فلهذا كان بروز الاسنان القواطع البدلية اقل انتظاما من بروز الاضراس بل قد يكون فوسها محتويا على اسنان زوائد ويعرف من كيفية بروز نمو الاسنان القواطع البدلية لماذا تنخفض جذور الاسنان القواطع اللبنية من اسطحها المؤخرة ولم تكن الاوصلة رقيقة قابلة للكسر بسرعة من المحل القريب من عنقها ويبقى باقيها مختصرا فى بواطن الاسنخة ملتصقا بقرب الاسنان البدلية ولا يشاهد الاعقب انكسار هذه الاسنان وبهذا الانكسار صار لوحها غير محتو على نجم جذرى وهذا شئ معقول * ومتى انقطع تغذى

الاسنان القواطع اللبنية ازدادت بياضا ونعومة وملاسة

الفصل الخامس فى العلامات التى يعرف بها عمر الحيوان

الواقع ان العلامات التى يستدل بها الطبيب على عمر الحيوان هى الاسنان لاغيرها من بقية اجزآء البدن لاسيما الاسنان القواطع لانها محتوية على جميع العلامات الحقيقية الدالة على عمر الفرس مدة حياته ويعسر معرفة هذه العلامات من الاضراس لعسر مشاهدتها ولعدم انتظام لوحها السنى اما الكلاليب فقد تختلف مدة بروزها بل قد لا توجد فى الفرس ولم يتحاك بعضها بعض وانما هى متصالبة فلا يصح الاستدلال بها على عمر الحيوان بل يصح جعلها علامة تبعية

واعلم ان للبحث عن ما يعرف به عمر الحيوان غير المشقوق الظافر من اسنانه القواطع ثلاث مدد احداها مدة التغير المختص بالاسنان اللبنية وثانيتها مدة بروز وانمساح الاسنان البدلية وثالثتها مدة حصول الاشكال المختلفة فى الاسنان البدلية من ابتدآء انمساحها الى نهاية عمرها * فبروز وانمساح الاسنان اللبنية يحصلان غالبا فى فصل الربيع لانه مولد الخيل فى الغالب فتحسب اعمارها منه ويندر عدم بروز سن من الاسنان القواطع فى ذالك الفصل ويبرز الضرس الاول والثانى عقب الولادة ولا يتاخر بروزهما عنهما الا بثلاثة ايام او اربعة فقط اما الضرس الثالث فيبرز فى آخر شهر الولادة واما الثنايا فتبرز فى اليوم السادس فما بعده الى اليوم الثامن واما الرباعية فتبرز من اليوم الثلاثين الى الاربعين واما النواجذ فتبرز من الشهر السادس

الى الشهر العاشر وقد تشاهد فى كل سن من الاسنان القواطع حين بروزها حافة حادة مقببة المقدم ومقعرة المؤخر وهى الحافة المقدمة اما الحافة المؤخرة فتظهر بعدها بايام ومتى ظهرت شوهد تجويف السن

ومتى كانت الام جيدة الصحة ونتاجها جيدا الغذآء والصحة اسرع بروز تلك الاسنان والواقع ان بروزها فى تلك المدة غير مهم لمعرفة العمر فان النتاج حينئذ لم يفارق امه فلو فارقها امكن معرفة عمره بالاستفهام عنه من بعض الاشخاص الذين شاهدوا ولادته (صفحة ١ شكل ١) والغالب ان الاسنان القواطع التى فى الفك الاعلى تبرز قبل الاسنان القواطع التى فى الفك الاسفل وقد يعكس الامر

ويعرف من سقوط الضرسين الاولين وبروز ضرسين آخرين فى محلهما ان الحيوان بلغ من العمر سنتين ونصفا ولا يعرف من سقوطهما اكثر من هذه المدة فلا ينبغى للشخص ان يتمسك به بعد بل يتمسك بالاسنان القواطع * والغالب ان الاضراس البدلية تبرز من الشهر الخامس الى السادس اما الاضراس الاخيرة فتعسر مشاهدتها فلا تكون دليلا على العمر * والواقع ان الضرس الاول منها يبرز من الشهر العاشر الى الحادى عشر وان الضرس الثانى يبرز فى الشهر العشرين وان الضرس الثالث يبرز فى السنة الرابعة فاكثر الى السنة السادسة ومتى برزت الاسنان القواطع اعتراها بعض تغير عقب تحاكك بعضها ببعض فان حافاتها المقدمة التى كانت مرتفعة حادة تأخذ فى الذوبان ثم تصير مساوية للحافة المؤخرة ويعتريهما الذوبان

معا ويضيق التجويف السنى بعدان كان واسعا ويصير مثلثا ثم يزول ويخلفه الدرب غير النافذ الذى للقرطاس السنى ومتى حصل هذا الذوبان بانتظام سمى انمساحا (صفحة ١ شكل ٤) ويحصل هذا الانمساح حين تلامس الاسنان بعضها لبعض بحيث تكون الثنايا قد انمسحت فى الغالب انمساحا تاما والنواجذ اخذت فى البروز ولا شك ان الانمساح يختلف فى الاسنان اللبنية ولا يستدل به الا على علامات غير حقيقية اما لكون مدة بروز النواجذ غير منتظمة انتظاما شديدا واما لكون مدة فطم المهار مختلفة واما لاختلاف مدة تغذيها بغذاء ليفى واما لكون الغذاء صلبا مختلفا باختلاف الاماكن

ومتى اخذت احدى الاسنان القواطع فى الذوبان وصارت حافتاها متسامتتين شوهد فى لوحها السنى شريطان من الجوهر العاجى احدهما ظاهر محيط بالسن وهو الجوهر الطلائى والآخر باطن محيط بالتجويف السنى فقط وهو الجوهر الطلائى المركزى (صفحة ١ وشكل ٣ و ٤) وبالجملة تنمسح الاسنان القواطع التى للفك الاسفل انمساحا اسرع من انمساح الاسنان القواطع التى للفك الاعلى واكثر انتظاما منه وبحث بعضهم عن سبب ذلك فلم يقف على حقيقته بل اختلفوا فمنهم من قال ان الجسم الحالك اكثر ذوبانا من الجسم المحكوك وحيثما كان الفك الاسفل هو المتحرك كانت اسنانه اشد انمساحا من اسنان الفك الاعلى ومنهم من قال ان ذلك ناشئ عن شدة ومتانة الاسنان القواطع العليا لكون الطبقة الظاهرة من الجوهر الطلائى والقرطاس السنى اغلظ من مثلهما فى تلك * والواقع ان السبب

الحقيق عدم تساوى القرطاس السنى الذى للاسنان القواطع العليا للقرطاس السنى الذى للاسنان القواطع السفلى فانى قابلت القواطع السفلى بالعليا فوجدت تجويف القواطع العليا اعمق من تجويف السفلى ووجدت قرطاسها السنى اطول من قرطاس تلك بمقدار ثلثه فلهذا يظهران ذوبان القواطع العليا اقل من ذوبان السفلى والواقع ان ذوبانهما متحد وهذا امر ظاهر وقد يعتبران القواطع السفلى تنمسح بانتظام اتم من انتظام انمساح القواطع العليا واظن ان ذلك ناشئ عن تحاكك السفلى بالعليا فعلى هذا يعسر علم مدة انمساح القواطع العليا لاسيما القواطع البدلية ومن زعم ان تحاكك تلك الاسنان يعرف به عمر الحيوان فقد اخطأ خطأ فاحشا

ولاشك ان الثنايا السفلى تنمسح فى الشهر العاشر من الولادة وان الرباعية تنمسح بعد سنة وان النواجذ تنمسح فى الشهر الخامس عشر تقريبا بعده الى الرابع والعشرين واذا تأملت فى الثنايا العليا وجدتها قد انمسحت انمساحا تاما ومتى بلغ الحيوان من العمر سبعتين زال القرطاس السنى من جميع الاسنان العليا والسفلى وترى الثنايا فى هذه المدة صغيرة محتنقة الاصل عارية عن اللثة سمراء مائلة الى الصفرة متخلخلة ليست ثابتة فى السن الا بجزء يسير ثم تسقط ويخلفها غيرها وهذا غاية المدة الاولى من عمر الفرس وتبتدى المدة الثانية ببروز وانمساح الاسنان البدلية

وقد تقدم ان القواطع البدلية مصفوفة خلف الاسنان اللبنية وان بروزها بالتدريج كبروز تلك بان تظهر اولا حافاتها المقدمة

ثم بعد شهر او شهرين تبرز حافاتها المؤخرة والواقع ان القواطع العليا البدلية تظهر فى الغالب قبل القواطع السفلى بثمانية ايام فاكثر الى خمسة عشر يوما وان الثنايا تظهر فى سنتين ونصف فاكثر الى ثلاث وان الرباعية تظهر من ثلاث سنوات ونصف الى اربع وان النواجذ من اربع سنوات ونصف الى خمس بمعنى ان الفرس اذا بلغ من العمر ثلاث سنوات صار مشتملا على اربع اسنان من الثنايا البدلية وان الفرس الذى بلغ اربع سنوات مشتمل على ثمانى اسنان من الثنايا المذكورة وان الفرس الذى عمره خمس سنوات مستكمل الاسنان القواطع فهذا هو المجمع عليه بدون استثناء بالنظر للطبيعة والجبلة لكن لا يخلو ذلك عن خطأ فان الفكين قد يتغيران فى بعض الاحيان

وقد فرضنا ان الحيوانات كلها تولد فى فصل الربيع كما تقدم والواقع ليس كذلك فان بعضها قد يولد قبله بثلاثة اشهر او اربعة وبعضها قد يولد بعده بهذه المدة فاذا فرضنا حيوانين ولدا بعد الربيع بالمدة المذكورة وكان احدهما بطيء النمو ومزاجه ضعيفا وغذاؤه رديئا والآخر بالعكس وبحثت عنهما فى شهر مسرى وجدت نواجذ احدهما ظاهرة ونواجذ الآخر مختفية ولم يظهر من اسنانه سوى الرباعية مع انهما بلغا من العمر اربع سنوات واذا تأملت فيهما بعد ذلك بتسعة اشهر فى شهر بشنس وجدت اولهما كامل الاسنان القواطع والآخر لم يظهر من اسنانه سوى النواجذ مع ان عمرهما خمس سنوات

واذا تركت الحيوان ونفسه وجدت هذه الاشياء نادرة الوجود ومن غش تجار الخيل انهم يقلعون نواجذ المهار واسنانها

الرباعية اللبنية ليسرع بروز الاسنان البدلية فترى هذه المهار كبيرة السن فيفتح من ذلك ان الفرس الذى لم تبرز نواجذه بالكلية فى شهر بشنس اوشهر بؤونة يكون عمره اربع سنوات فقط والواقع ان الفرس متى بلغ من العمر خمس سنوات برزت نواجذه وصار صالحا للضراب فان لم يبلغ هذا السن بان نقص عنه بشهرين اوثلاثة اواربعة صار شارعا فى السنة الخامسة وان كان اقرب الى السنة الرابعة من السنة الخامسة قيل له جاوز الاربع فالفرق بين قولنا شرع فى كذا وجاوز كذا مبنى على المدة التى يبحث فيها عن عمر الحيوان لانا قد فرضنا ان جميع الحيوانات تولد فى فصل الربيع

واعلم ان بروز جميع الاسنان اللبنية والبدلية يختلف باختلاف الاقاليم فان بروز الاسنان القواطع البدلية التى للخيل المتربية فى اسفل فرنسا يحصل فى شهر توت والغالب حصوله فى شهر بابة ويتأخر دائما فى البلاد الباردة فيحصل فى خيل نورماندية فى شهر طوبة اواشيرا وبرمهات وقد يحصل فى بعض الاحيان فى شهر برمودة ويحصل فى خيل ليموزان فى شهر طوبة والواقع ان هذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف تأثير الاقاليم فانك اذا اخذت مهرا من بلاد باردة ووضعته فى بلاد حارة اسرع بروز اسنانه واذا عكست ابطأ البروز

والغالب ان اول الاضراس البدلية يبرز فى الشهر الثلاثين اوالثانى والثلاثين وان الضرسين الاخيرين لا يظهران الا بعد ثلاث سنوات من الولادة وان الاضراس الزائدة متى وجدت قذفت بالضرس الاول البدلى حين انقذاف الضرس اللبنى

وقد يستمر هذا الضرس بجانب الضرس الزائد ولا يكون ذلك
فى الغالب الا فى الفك الاسفل لان الضرس الاول من هذا الفك
بعيد عن ذلك الضرس

وتبرز الانياب فى المدة المذكورة لكن قد يختلف بروزها فتارة
تبرز فى السنة الثالثة من عمر الحيوان وتارة يتأخر بروزها الى
السنة السادسة والغالب بروزها فى السنة الرابعة فلهذا
لا يمكن الشخص ان يتخذ له منها قاعدة مطردة يستدل بها على
عمر الحيوان

ولا شك ان قوة بروز السن ليست منحصرة فى جهته بل عامة
لجميع جهات السن فانك ان تأملت لرأس فرس او مهر مات
فى مدة بروز اسنانه وجدت صفايح عظام فكيه ذائبة والغالب
ان تكون مثقوبة فلهذا كانت الامراض الالتهابية تكثر
فى هذه المدة ويختلف قبحها باختلاف انواع الحيوان واختلاف
بروز الاسنان من حيث السرعة والبطؤ وان الامتلاء الدموى
الذى يعقب المدة المذكورة يجعل الرأس مستديرا واستدارته
دليل على صغر السن ومتى زال سببها زالت * وذوبان القواطع
البدلية يحصل بانتظام تام به يعرف عمر الحيوان معرفة تامة
كما هو منصوص فى جميع المؤلفات البيطرية المختصة بمباحث
بصدده فقد نصوا على ان ذوبان الثنايا السفلى يحصل من ابتداء
السنة الخامسة الى السنة السادسة ويحصل ذوبان الرباعية من
السنة السادسة الى السابعة ويحصل ذوبان النواجذ من السنة
السابعة الى الثامنة وهلم جرا لكن متى بلغ الحيوان من العمر ثلاث
سنوات وهى المدة التى تبرز فيها ثناياه الى خمس سنوات فلا بد من

تحاكك تلك الثنايا واخذت النواجذ فى البروز فالعبرة حينئذ بالاسنان التى لم تتحاكك فان اردت معرفة عمر الحيوان فى هذه المدة فعليك بنواجذه لاسيما ان كنت ممارسا لهذا الفن * واذا بلغ الحيوان خمس سنوات ولم يوجد شئ من تلك العلامات برزت النواجذ بدون ان تسامت الرباعية وكانت حافاتها المقدمة اعلى من حافاتها المؤخرة وهذا كله مفروض فى الاسنان القواطع السفلى لان تحاككها منتظم وحكت الحافة المقدمة من الرباعية حكا خفيفا وصارت الحافة المقدمة التى للثنايا مسامتة للحافة المؤخرة منها وزال معظم التجويف السنى واذا اعتبرت القواطع العليا والسفلى معا وجدتها كنصف دائرة منتظمة وبرزت الانياب كلها فى الغالب بدون انمساح شئ منها

وفى السنة السادسة تصير النواجذ مسامتة للرباعية وتتحاكك حافاتها الظاهرة تحاككا خفيفا وتكتسب الرباعية الهيئة التى كانت عليها الثنايا فى السنة الخامسة وتنمسح هذه الثنايا انمساحا تاما ويبرز الضرس الاخير فيصير الفرس حينئذ محتويا على اربعين سنا منها قواطع اثنتا عشرة واربع وعشرون ضرسا واربع انياب * وقد توجد اسنان زائدة على هذا المقدار

وفى السنة السابعة تنمسح الرباعية وتصير الحافة الظاهرة التى للنواجذ مسامتة للحافة الباطنة * ويظهر فى النواجذ العليا شرم وفى السنة الثامنة تنمسح جميع الاسنان السفلى لكن هذه القاعدة غير مطردة لان التجويف السنى الذى للنواجذ قد يستمر الى السنة التاسعة فاكثر * وهذا ناشئ عن عدم تحاكك النواجذ تحاككا منتظما وتصير الاسنان المذكورة متساوية

وتغير هيئتها فتصير بيضية الشكل ويخلف التجويف السني بارزة مستطيلة معترضة ناشئة عن الجوهر الطلائي ليست الا قعر القرطاس السني ومنتهي الجوهر الطلائي المركزي (صفحة ١ شكل ١٠) وتبتدي المدة الثالثة باختلاف هيئة الاسنان بالتدريج وحدوث النجم السني

واعلم انه متى بلغ الحيوان ثماني سنوات وانمسحت اسنانه القواطع العليا فقط لم يستدل على مازاد عليها الا بانمساح القواطع السفلى وهذا الانمساح هو الواسطة العظمى في معرفة ذلك كما زعمه بعضهم وكان يقول هذا البعض اذا جاوزها الحيوان فقد جاوز العمر الغالب وهذا خطأ فاحش لان بين الحيوان الذي بلغ من العمر تسع سنين والحيوان الذي بلغ ثماني عشر سنة فرقا بعيدا من حيث الثمن والاعمال فينبغي الاجتهاد في معرفة العلامة الدالة على بلوغ الحيوان ثماني عشرة سنة فاكثر ولا شك ان معرفتها سهلة

وقد ذكرنا ان الاسنان القواطع تبرز كبقية اسنان الحيوان في مدة حياته وان كل جزء من اجزائها يكون اللوح السني بالتدريج وانه متى كان احتكاكها منتظما وتم انمساحها صار لوحها باعتبار العمر بيضي الشكل ثم مستديرا ثم مثلثا ثم مفرطح الجوانب (صفحة ٢ وشكل ٨ و ٩) ونحن نذكرها من ملحوظات الحكيم بيسنا جميع التجربات التي فعلها بتدقيق ونترك منها ما لا فائدة فيه فنقول ان القواطع التي كانت حين بروزها في السنة الثالثة والرابعة والخامسة مفرطحة من الامام الى الخلف ومستطيلة من احد جانبيها الى الآخر ينقص طولها

بالتدريج بمعنى انه متى بلغ الحيوان من العمر ثمانى سنوات صارت ثناياه السفلى بيضية الشكل وكذلك رباعيته ونواجذه وصار لوحها مستديرا الى ان يبلغ الحيوان ثلاث عشرة سنة فحينئذ تتغير هيئة تلك الاسنان فتصير مثلثة بالتدريج بعدان كانت بيضية الشكل مستديرة (صفحة ٢ وشكل ٧ و ٨) والواقع ان هيئة التثليث قليلة الظهور لان حافة السن مستديرة نوع استدارة ولان جوانبها الثلاثة متحدة الطول تقريبا ثم تستطيل الاجزاء الجانبية وترى الحافة المقدمة ناقصة وتصير الاطراف ذات زوايا وتظهر تلك الاستطالة ظهورا تاما بحيث متى بلغ الحيوان تسع عشرة سنة اوعشرين صارت اسنانه القواطع مفرطحة من احد جوانبها الى الآخر (شكل ٩) ثم ان بعض الحيوان متى بلغ ست سنوات صارت اسنانه القواطع السفلى مثلثة تثليثا جيدا مع ان التثليث دليل على بلوغ الحيوان اربع عشرة سنة اوخمس عشرة وقد يدرك هذا التثليث العجيب بوجود الجوهر الطلائى المركزى فى جميع القواطع السفلى

ثم ان التفرطح من احد الجانبين الى الآخر قد يعترى بالتدريج الثنايا ثم الرباعية ثم النواجذ بحيث يستدل به الطبيب على بلوغ الحيوان اثنتين وعشرين سنة فاكثر الى ثلاث وعشرين سنة وهذا كله رأى الحكيم بيسنا والواقع انك اذا اعتبرته اجمالا وجدته صحيحا بخلاف ما اذا اعتبرته تفصيلا لاسيما تقسيم المدد المختلفة فتجده مخالف الواقع فانه جعل المستدير والمثلث وذا الزاويتين اشكالا هندسية منتظمة لا محالة والواقع ليس كذلك

الا فى بعض احوال يسيرة جدا وما زعمه يقتضى ان ذوبان الفلك الاعلى يحصل بانتظام كذوبان الفلك الاسفل وان العلامات والاوصاف المأخوذة من الفلك الاعلى الدالة على عمر الحيوان لا تتغير وان اردت اثبات خطأ ذلك الحكيم احتجت الى ان نذكر لك جميع ما قاله فى ذوبان وزوال التجويف الظاهر الذى للاسنان وهذا شئ يطول وزعم ايضا ان المتمسك بقواعده لا يغلط فى عمر الحيوان الا بشئ يسير ونحن وكلنا الامر فى ما ذكرناه الى الاطباء البيطريين

ولا يشاهد عقب انمساح التجويف الظاهر الذى للاسنان القواطع من فوق اسطحتها المتحاكة الانواة من الجوهر الطلائى مستطيلة من احد جانبيها الى الآخر ومنخفضة الوسط وقريبة من الحافة المؤخرة اكثر من الحافة المقدمة وليست فى الواقع الا قعر القرطاس السنى الظاهر الذى مكث فيه الجوهر الطلائى مدة ثم يضيق ويستدير ويقرب من الحافة المؤخرة ثم يزول بالكلية (صفحة ٢ شكل ٤ و ٥) فهذا السير التدريجى والازالة لا يستغربان لا سيما اذا امعن النظر فى انتظام هذا القرطاس السنى كما تقدم وقد ذكرنا ان التجويف الذى يمتد فى الجزء المنطاق من السن بين السطحين الباطنين اللذين للجوهر الطلائى المركزى * وقد يتعلق هذا التجويف من تراكد طبقات جديدة من الجوهر العاجى فيه ثم يصير ظاهره كدرب غير نافذ محتو على جوهر عاجى ثم يكون بعد مضى مدة من عمر الحيوان النجم السنى فى وسط السطح الحالك وقبل زوال القرطاس السنى بالكلية حين تكون هيئته كهيئة شكل بيضى يظهر قعر التجويف

اللبي امام قعر هذا القرطاس بقرب الحافة المقدمة على هيئة شريط معترض اصفر في الابتداء ثم يصير مستديرا سنجابي اللون ثم يصير ابيض مستطيلا من الامام الى الخلف (شكل ٣ و ٤) ثم ان قعر التجويف المتقدم مخالف لقعر القرطاس المذكور مخالفة شديدة لانه لا يكون بارزة فوق اللوح السني بل هو مساو دائما لهذا اللوح ومستمر الى سقوط السن بخلاف ذلك فان زال في بعض الاحيان ترك دائما تجويفا صغيرا مستديرا اسود

ويجب علينا قبل الخروج عن هذا الموضوع ان نذكر نبذة صغيرة فنقول ان القرطاس السني المحاط بالجوهر الطلائي ليس متحد الطول في جميع الاسنان القواطع بل الغالب ان يكون في الرباعية اطول منه في الثنايا وانه في النواجذ اطول منه في الثنايا وهذا الاختلاف واضح وقد يزول من النواجذ مع بقائه في الرباعية والثنايا ولا يخفى ان طول ذلك القرطاس في الاسنان العليا مقدار نصف طوله في الاسنان السفلى فبهذا يعلم ان مكثه في الاسنان العليا اطول من مكثه في الاسنان السفلى مع انها متحدة الطول فيكون تغير هيئتها في زمن واحد وكذلك بروزها في الخارج فبهذا تعلم ان ما ذكره الحكيم بيسنا في هذه القضية ليس جيدا وما ذكرناه مفروض في ذوبان الاسنان العليا ذوبانا منتظما مع انه ليس كذلك فان تمسكت بجميع القواعد التي ذكرناها امكنك ان تعرف جميع عمر الحيوان بواسطة الاوصاف الآتي بيانها

وحين بلوغ الحيوان ثماني سنوات (صفحة ٢ شكل ١) تنمسح في الغالب جميع الاسنان القواطع السفلى وتصير الرباعية

والنواجذ بيضية الشكل ويصير الجوهر الطلائى المركزى مثلثا قريبا من الحافة المؤخرة ويظهر النجم السنى بقرب الحافة المقدمة على هيئة شريط اصفر مستطيل من احد جانبيه الى الآخر

ومتى بلغ الحيوان تسع سنين (شكل ٢) استدارت الثنايا السفلى وضاق اللوح السنى الذى للرباعية والنواجذ ونقص الجوهر الطلائى المركزى وقرب من الحافة المؤخرة

وفى السنة العاشرة (شكل ٣) تستدير الرباعية والجوهر الطلائى المركزى ويقرب هذا الجوهر من الحافة المؤخرة

وفى السنة الحادية عشر (شكل ٤) تستدير الرباعية ويزول معظم الجوهر الطلائى المركزى من الاسنان السفلى

وفى السنة الثانية عشر (شكل ٥) تستدير النواجذ ويزول الجوهر الطلائى المركزى بالكلية وينمسح اللوح السنى ويتسع النجم السنى فيصير شاغلا لوسط السطح الحالك ولم يزل قعر القرطاس السنى باقيا فى الاسنان العليا

وفى السنة الثالثة عشر (شكل ٦) تستدير جميع القواطع السفلى وتستطيل جوانب الثنايا وينمسح قعر القرطاس السنى من النواجذ العليا ويستدير فى الثنايا والرباعية ويقرب من حافتها المؤخرة

وفى السنة الرابعة عشر (شكل ٧) تتثلث الثنايا السفلى وتمتد جوانب الرباعية وتتلاشى الجوهر الطلائى المركزى الذى للاسنان العليا مع بقاء اثره

وفى السنة الخامسة عشر (شكل ٨) يتم تثلث الثنايا السفلى

وتأخذ الرباعية فى التثلث ولم يزل الجوهر الطلائى المركزى باقيا فى الاسنان العليا

وفى السنة السادسة عشر يتم تثلث الرباعية وتأخذ النواجذ فى التثلث ويزول الجوهر الطلائى المركزى من الرباعية العليا فى الغالب

وفى السنة السابعة عشر (شكل ٩) يتم تثلث الاسنان السفلى وقد تقدم ان جوانبها متساوية حينئذ وان الثنايا العليا التى تذوب ذوبانا منتظما يزول منها فى هذه المدة جوهرها الطلائى المركزى ويبتدى انمساحها

وفى السنة الثامنة عشر تمتد الاجزآء الجانبية من تلك الثنايا المثلثة والرباعية والنواجذ بحيث متى بلغ الحيوان من العمر تسع عشرة سنة صارت الثنايا السفلى مفرطحة من احد جوانبها الى الآخر

وفى السنة العشرين تصير هيئة الرباعية كهيئة الثنايا المتقدمة وفى السنة الحادية والعشرين تكتسب النواجذ تلك الهيئة وتبطل من القواطع العلامات الدالة على عمر الحيوان لانها تتفرطح حينئذ ويترآآ انها آيلة الى مركز واحد ومتلامسة بحافاتها المقدمة الجانبية وتتعرى وتبيض اللثة ويضيق الفك ويصير اللوح السنى سنجابى اللون والاسنان القواطع صفرآء ويستتر اصلها بطبقة مخينة من الصدا فان اعتبرت ذلك كله فى مطلق حيوان وجدته دليلا على الهرم ولا شك ان بروز جذور اسنان الفرس وطولها ناشئان عن ضيق الاسنخة بمعنى انه كلما ضاق السنخ دفع جذر السن الى الخارج اذا علمت ذلك علمت ان

ثبات الجذر يكون بتضايق السنخ عليه فبهذا التضايق والاتجاه الافقي الذي يصدر من الفكين حين تقدم الحيوان في العمر اضطر الحكيم تينو وغيره من الاطباء الى ان ينسبوا ذلك الى احتكاك احد الفكين بالآخر وانا اقول ان احتكاكها بعضها لا اصلي لحدوث تلك النوادر والواقع ان جوانب الفك الاعلى تنخفض ويرتفع الفك الاسفل ويرى الرأس مستطيلا دقيقا وهذا دليل على الكبر لا محالة

والاتجاه الافقي الذي للفكين يدل دائما على التقدم في العمر وهو واضح في بعض الخيل وخفي في بعضها ولم يعلم سبب ذلك وبالجملة تمكث قواطع الفرس مدة زائدة على العمر الذي نص عليه اليونانيون ويستدل بها الشخص على عمر الحيوان من حين ولادته الى بلوغه عشرين سنة فيستدل اولا ببروزها ثم بانمساح تجويفها الظاهر ثم بتغير قرطاسها وزواله ثم بهيئة لوحها السني التي يكتسبها بالتدريج من بعد بلوغ الحيوان تسع سنين فانه يكون بيضي الشكل ثم يستدير ثم يتثلث ثم يتفرطح * ثم ان بروز وانمساح القواطع المتقدمة هما العلامتان الحقيقيتان اللتان يستدل بهما على ما مضى من عمر الحيوان فبمدة هذين الشيئين تسهل معرفة عمر الحيوان بدون غلط فان هذه المدة مشتوية على وسائط بها ينضبط العمر انضباطا تاما وهي حال قعر القرطاس السني وظهور النجم السني وانمساح اللوح السني بالكلية وهيآتها التي يكتسبها بالتدريج * ولا شك ان مدة التثلث والتفرطح هي المدة التي يمسر فيها معرفة عمر الحيون معرفة جيدة فلا يمكن الطبيب ان يحكم على الحيوان الذي بلغ من العمر

ست عشرة سنة فاكثر الى عشرين بتحديد المدة ولاجل سهولة
معرفة ماذكرناه من الاعتبارات المتعلقة بعمر الفرس التزمنا
ان نذكر جدولا تسهل مراجعته عند الحاجة اليه وهو المذكور
فى تأليف الحكيم بيسنا وهذه صورته

فصل فى الاختلافات المختصة بترتيب بروز وانمساح القواطع

قد ذكرنا فى الفصول المتقدمة ان الاسنان القواطع يعتريها بعض تغيرات فتمنعها ان تسير السير المعتاد فتنوع حينئذ تنوعات مختلفة فينبغى البحث عن بعض احوال عرضية تخالف القواعد المطردة التى مر الكلام عليها ومن المهم ان نبرهن على الوسائط التى بها يمنع الغلط ويعرف العمر معرفة جيدة ما امكن

بيان الفرس القبيح الفم من حيث اسنانه

اعلم ان الاسنان القواطع لا تبرز ولا تذوب بانتظام جار على القواعد السابقة فلا نعتمد عليها فى جميع الاحوال وفى جميع الخيل لان بروزها قد يكون غير طبيعى وقد تكتسب اتجاها قبيحا وقد يستتر بعضها من الاسنان اللبنية فتصير زوائد فمن ذلك سمى الفرس بالفرس القبيح الفم وقد تظهر هذه التغيرات بكيفيات مختلفة احداها ان تكون السن طويلة او قصيرة * وثانيتها عدم انتظام احتكاك اللوح السنى مع كون انماحه منتظما وثالثتها اختلال سير الاسنان وهذا كله ناشئ اما عن كون الجوهر الطلائى اصلب من غيره فى بعض الخيل واما عن كون نمو الجذر اقوى من انماح اللوح السنى واما عن قبح تركب واتجاه الفكين بحيث لا يحصل التحاكك فوق اللوح السنى الذى للاسنان القواطع وكثيرا ما تكون الاسنان القواطع فاحشة الطول فلهذا لا ينبغى التمسك بالقواعد السابقة فى هذه الاحوال لعدم اضطرادها فيها ولكونها مبنية على النمو والانماح المستمرين المتساويين فى الاسنان وقد اجتهد الحكيم

يسنا ان يصلح هذا الخلل فلم يبلغ جميع مقصوده بل حصل على يسير منه * ومما يثبت ذلك ما نشاهده كل يوم فى فحول الحيوانات

والغالب ان طول الثنايا مقدار ثمانية خطوط وطول الرباعية مقدار سبعة وطول النواجذ ستة اذا علمت ذلك فاعتمد على ما بين الستة والثمانية وهو السبعة ومبدؤها السنخ ومنتهاها السطح الحالك وعلى ما قاله الحكيم يسنا يكون مقدار ما يذوب فى العام الواحد من كل سن من اسنان الخيل الجيدة خطا ومقدار ما يذوب من اسنان الخيل الدنية خطا ونصفا وذلك بحسب تحاكك الاسنان تحاككا منتظما ثم ان كان طول الجزء المنطلق من الاسنان القواطع مقدار سبعة خطوط علم ان ذوبانه قليل وان الفرس متقدم فى العمر تقدما زائدا على ما يستنتج من اسنانه فان قيل ما مقدار تقدمه قلت يعلم مما تقدم ولا شك ان مقدار ما يذوب من السن فى كل سنة خط فان كانت السن مشتملة على ثلاثة خطوط زائدة على الخطوط الطبيعية علم ان الفرس متأخر عن العمر المعتاد بثلاث سنوات فان صرفت النظر عن ذلك وفرضت انك قطعتها قطعا معترضا علمت الحقيقة فيبنى على ذلك انك اذا اردت ان تعرف عمر الفرس الذى اسنانه القواطع طويلة جدا فاسقط من العمر المأخوذ من اللوح السنى مقدار الخطوط الزائدة فى هذه الاسنان اما اذا كانت قصيرة فيعلم ان الفرس متقدم فى العمر فان اردت معرفة عمره فاضف الى ما علمته من قصرها مقدار الخطوط الناقصة منها وهذا شئ اغلبى فى الخيل المتقدمة فى العمر التى زال من اسنانها جوهرها

الطلائى * والغالب ان قصر تلك الاسنان ناشئ عن تحاكها
تحاكا قبيحا كسيا ذابت منه والواقع انك اذا امعنت نظرك
فى الاعتبارات المقدمة لم تستدل بها على تحديد عمر الحيوان
تحديدا دقيقا فان قيل من اين يؤخذ هذا التحديد قلت
هلا تمسكت بما ذكره الحكيم بيسنا وتركت قواعد الحكيم لافوس
ولم تعكس فعكسك حينئذ خروج عن الصواب ولا تظن ان
المتمسك يقول بيسنا انا ومن تبعنى فقط بل المتمسك به جم غفير
لكونه صوابا كما يعلم لمن تأمله ومتى علمت هذه القواعد سهل
عليك معرفة عمر فرس مختل الاسنان ثم ان بقاء التجويف
الظاهر مدة زائدة على المدة التى حقه ان يزول فيها يوجب خللا
فى الاسنان لم يحصل فى الغالب الا بعد مضى ست سنوات من
الولادة ومن الخيل ماله سن واحدة مختلة ومنها ماله اسنان
متعددة غير منتظمة * ومتى كان تحاكك الاسنان غير منتظم
واستمر الجوهر الطلائى باقيا فى المدة التى حقه ان يزول فيها
قيل لذا التحاكك تحاكك كاذب والغالب انه لا يحصل الا اذا
بلغ الحيوان من العمر ثنتى عشرة سنة واياما كان هذا التحاكك
لا يوقع الشخص فى ريب الا اذا اهمل البحث عنه ولم يمعن نظره
فى هيئة اللوح السنى وفى طول الاسنان وفى بقية الاوصاف
التى مر الكلام عليها فاذا راعى هذه الاشياء امن الغلط فى عمر
الفرس سواء كان التحاكك كثيرا ام قليلا نعم يشترط ان
يكون هذا التحاكك حاصلا فى اللوح السنى بالكيفيات السابقة
فان كان حاصلا بغيرها واتلف الهيئة الطبيعية التى للاسنان
تعذر على الشخص معرفة العمر من هذه الاسنان وانما يمكنه

معرفته من البحث عنها ليعرف اهى قديمة ام حديثة لاسيما هيئة
الانياب * وهذا الشئ يحصل غالبا فى الخيل التى تحك اسنانها
فى قعور معالفها حكا قبيحا والخيل التى يأكل حبالها المربوطة
هى بها وهى فى الغالب بعض الخيل الانجليزية ويكثر ذلك منها
حين تطميرها * فان كانت الاسنان البدلية خلف الاسنان اللبنية
لم تذب اللبنية من جذورها ولم تضغط اوعيتها ولا اعصابها
ولم تتلف حاجزها الذى للسنخ فلم تسقط حينئذ بالكلية فتكون
فى هذه الحال صفين يمنعان ملامسة الاسنان العليا للسفلى
باسطحتها الحاكة بحيث تتغير هيئتها فلا يتمكن الطبيب حينئذ
من معرفة العمر وهذه الحال اقبح الاحوال واصعبها فالاصوب
عندى دعوى الجهل بها وهى نادرة فالله الحمد على ندورها
والغالب انه لا يبقى فيها من الاسنان اللبنية الا سن او سنان تصير
هيئتهما قبيحة جدا ثم تسقطان ولا تمنعان معرفة العمر

بيان الخيل التى تفعلها تجار الخيل
ليغشوا بها مشتريها من حيث العمر

اعلم ان تجار الخيل يحبون دائما ان تكون خيلهم حاصلة على
العمر الذى يرغب فيه المشترى ليبيعوها باغلى ثمن فان كانت
صغيرة فعلوا بها ما يظهر للمشترى انها كبيرة وعكسه بعكسه *
ثم ان اهل بعض الاقاليم التى تربى فيها الخيل لاسيما اقليم
نورماندى يقلعون من اسنان الحيوان رباعيته اللبنية لاسيما
رباعية الخيل التى تأخر بروز اسنانها التبرز الاسنان البدلية
بسرعة وبعض التجار يقلع نواجذ الخيل ليرى ان اسنانها البدلية
كاملة مع انها لم تبلغ من العمر اكثر من اربع سنوات ونصف

وقد ذكرنا الوسائط التي بها يأمن الطبيب من الغلط عند الكلام
على الاسنان القواطع البدلية وحيثما كان ماذكرناه مهما التزمنا
ان نقويه بعض اعتبارات جديدة فنقول ان الخيل التي تسنها
صار قبيحا بقلع اسنانها البدلية ترى انها بلغت من العمر خمس
سنوات مع انها لم تبلغ اربعا فينبغي للطبيب البيطري ان يبذل
جهده في ما يعرف به هذا الغرر والغش ولا ينبغي ان يعتمد على
الانياب لانها تبرز غالبا في السنة الرابعة بل قد تبرز قبلها وقد تبرز
في السنة السادسة ثم ان التفت التفاتا جيدا الى صف الاسنان
التي برزت قبل اوان بروزها بواسطة غش تجار الخيل وجد غير
منتظم فانه اذا كان بروز الاسنان البدلية طبيعيا واتمسحت بعد
قذفها الاسنان اللبنية اصطفت اصطفافا منتظما بعضها بجانب
بعض وصارت قوسا منتظما حين بلوغ الحيوان خمس سنوات
بخلاف ما اذا كان بروزها غير طبيعي بان قلعت الاسنان اللبنية
قبل اوان سقوطها فتصير حينئذ الاسنان البدلية معترضة
وقوسها مختلا وتصير اللثة والحافة السنخية حمراوين منتفختين
وترى انها دافعة الصف السني الى جهة الخلف فهذه الحال
واضحة لاسيما في مدة القلع وقد يبقى في بعض الاحيان بعض
فضلات من السن ماكثا في عظم الفك ظاهرا امام الاسنان
البدلية وبالجملة يكتسب القوس السني الذي للاسنان القواطع
هيئة مخصوصة لا تخفى على من مارس الفن ومتى قلعت سن من
الاسنان اللبنية قبل اوان انقلاعها صار موضعها منتفخا
مرضوضا متقرحا فلهذا امكن الطبيب ان يعرف غش
تجار الخيل * والغالب انهم لا يفلحون الا اسنان الفك الاسفل من

خيل كثيرة فيسبق بروزها بروز الاسنان العليا وهذا امر سهل لايوقع الطبيب فى الغلط

وعلى ماقاله الحكيم سولينزيل وغيره من جمهور الاقدمين يكون طول الاسنان علامة على تقدم الحيوان فى العمر وهذا الرأى وان كان مقبولا الا انه غير مضطرد لان الخيل المتقدمة فى العمر تقدما شديدا تكون اسنانها قصيرة جدا كما تقدم مالم يكن اتجاهها افقيا على اننا لو فرضنا اضطراد ذلك الرأى فى جميع الازمان حتى زمن الكهولة ظهر انها غير متقدمة فى العمر بواسطة قطع اسنانها بمنشار فهذه الحال تلجئ الجاهلين بهيئة ومسح وغو الاسنان القواطع الى ان يتمسكوا بذلك اما العارفون فلا يخفى عليهم هذا الغلط بل يعرفون حقيقة العمر ولو تغيرت احوال الاسنان ولنذكر لك شاهدا مؤيدا لما ذكرناه وهو انه اذا كان امامك فم فرس واردت معرفة عمره فان رأيت الثنايا ورباعيته السفلى مستديرة وجوهره الطلائى مستديرا ايضا قريبا من الحافة المؤخرة وكان النجم السنى واضحا شاغلا لوسط اللوح السنى ومربع الهيئة علمت ان الحيوان بلغ من العمر احدى عشرة سنة لكن لايخفى ان طول هذه الاسنان مقدار عشرة خطوط مع ان حقه ان يكون اذ ذاك مقدار سبعة خطوط فقط فيظهر منه ان الحيوان متقدم فى العمر فيحتاج الشخص الى ان يزيل من ذلك الطول ثلاثة خطوط فتصير الثنايا حينئذ مثلثة وتأخذ الرباعية فى التثلث وزال الجوهر الطلائى بالكلية فيظهر ان الحيوان قد بلغ من العمر اربع عشرة سنة مع انه لايظن بلوغه ذلك الا بهذا الغش الذى لايعرف الا بالعقل * ثم

ان كانت اسنان الفرس ليست طويلة جدا صنع اولئك التجار تجويفا شبيها بالتجويف الذى زال من مدة طويلة ليصير الفرس شبيها بالفرس الذى بلغ من العمر ست سنوات ويعسر جعله شبيها بالفرس الذى بلغ خمس سنوات فقط وهذا من الغش الذى يغتر به المشترى * ولا حاجة الى ان نذكر الوسائط التى تخفى الغش المذكور الذى لا يخفى الا على الجهلة اذ من المعلوم ان كلا من الجوهر الطلائى المغطى للتجويف الظاهر والجوهر الطلائى المحيط به اشد يبوسة من باقى اللوح السنى وانه بارز فى سطحه * ومتى وجد القرطاس فى الدرب الغير النافذ من تعذر اصطناع تجويف فى وسطه بل يحفر تجويف بقرب حافته المقدمة ويعرف الغش من محل هذا التجويف ومن وجود الجوهر الطلائى المركزى فى لوح الدرب غير النافذ * واذا بلغ الحيوان من العمر اكثر مما ذكرنا وقد زال من اسنانه الجوهر الطلائى المتقدم لم يكن التجويف الجديد محاطا بحافة بارزة غير مانعة من مساواة اللوح على ان هيئة الاسنان واحوال الفك كافية فى معرفة تحديد عمر الحيوان فان هيئة التجويف الخلقى ملايمة للوح السنى بخلاف هيئة التجويف المصطنع

الباب الثانى فى مقابلة عمر ذوات الاربع بعمر الخيل وفيه فصول

قد ذكرنا فى مقدمة هذه الرسالة ان الجزء المضاف الى عمر الخيل مشتمل على اعمار البقر والضأن والكلاب والخنازير التى باضافتها الى الحيوان غير المشقوق الحافر صارت معرفتها اهم للبيطرى من معرفة غيرها وقد تركنا الكلام على الهر لعدم الفائدة ولانه

يعرف من القواعد التي ذكرناها في الكتاب لاتحاد نبت وانمساح
اسنانهما نعم قد رأينا ان الاسنان القواطع اللبنية للهر الحديث
تسقط دائما قبل نبت قواطع اسنان الهر البالغ ويسقط معظم
القواطع اللبنية في آن واحد ويبقى الفك خاليا عن القواطع
اثنى عشر يوما فاكثر الى خمسة عشر يوما فتظهر حينئذ
القواطع البدلية * وما قيل في عمر الفرس يقال هنا ما عدا بعض
اشياء يأتي الكلام عليها في محلها * وقد ذكرنا ان الواسطة
العظمى في معرفة عمر الخيل هي التغيرات التي تعترى اسنانها
فان اسنان جميع الحيوانات متحدة النظام والاقسام والتركيب
والتغير والنبت والنمو والوظائف * ومن المعلوم ان الاسنان
القواطع والاسنان الثلاث التي قبل الاضراس والانياب اللبنية
تسقط في بعض ازمنة معينة ويخلفها غيرها من اسنان البلوغ
فتظهر اما خلف الاسنان الساقطة واما تحتها فتضغطها وتغيرها
وتدفعها الى الخارج * وجميع الاسنان تتكون في بواطن العظام
الفكية وتكون في الابتداء ليفة ثم تتصلب وتيبس بالتدريج ثم
تثقب اللثة باطرافها الدقيقة وتنمو من جذورها وتذوب
بالخصوص من الواحها وكل واحدة منها مركبة من ثلاثة
جواهر وهي الجوهر العاجي والجوهر الطلائي والجوهر
القشري وكلاها مختلفة الصلابة والرئيس منها الاثنان الاولان
اما الجوهر القشري فمادة دهنية منتشرة على السطح الظاهر من
الجوهر الطلائي المحيط وتسري في ثنيات لوح الاسنان * وقد مر
الكلام على جميع هذه الجواهر فلا عود ولا اعادة وان القواعد
العامة التي جعلناها للخيل هي بعينها القواعد التي لغيرها من

سائر

سائر الحيوانات الاهلية نعم قد توجد اختلافات كثيرة ولا نلتفت الا الى اهمها فان فى ذكره فائدة نافعة

الفصل الاول فى اعمار البقر

اعلم ان هذا الفصل من فروع الهيئة الظاهرة التى للبقر وانه كان مجهولا فى العصر الخالية بالنسبة لاعمار الخيل لاسيما فى عصر لافوس وبورجلا وان من تكلم على هذه الاعمار شرذمة قليلة بدون توضيح وان جمهور المتأخرين لم يذكروا شيأ من عندهم بل نقلوا كلام المتقدمين وانهم اقتصروا على معرفة تلك الاعمار باعتبار بروز الاسنان البدلية واهملوا التغيرات التى تعتريها حين امساحها اما المعلم ليونيه والمعلم كروزيل فقد جازا هذه العقبة واظهرا ان التغيرات التى تعترى الاوح السنى وتنشأ عن تحاكه قد يستدل بها على الاعمار التى نحن بصددها ثم لما تكلم المعلم ليونيه على احوال الاسنان القواطع اجمالا ذكر ان الدائرة الناشئة عن هذه الاسنان تتناقص كلما تقدم الحيوان فى العمر وذكر ايضا ان الحيوان متى بلغ من العمر ثمانى سنوات او تسعا صارت ثلاث الاسنان كخط افقى واذا وصل الى التسع امكن الشخص ان يعرف بواسطة امساح الاسنان المذكورة وصوله اليها والى ما بعدها الى السنة الرابعة عشر فمتى بلغها صارت اسنانه قصيرة مستديرة اما ما ذكره المعلم كروزيل فى وقائع الطب البيطرى فاحسن ما قيل فى اعمار الحيوانات المجترة فانه فى غاية الدقة

وليست الاسنان القواطع المتقدمة هى التى يعرف بها اعمار البقر لا بغيرها بل مثلها القرون الجبهية لاشتمالها على حدبات

يستدل بها على معرفة تلك الاعمار وهي في الغالب صحيحة واضحة يمكن الاستعانة بها على تحديد العمر وايا ما كانت تغيرات القرون يؤمن معها الغلط الذي قد ينشأ عن احوال الاسنان او يؤيد بها ما يفهم من تلك والاحسن مراعاة كل من القرون والاسنان القواطع اذ بهما يعرف الانسان ما بينهما من المناسبة التي لا ينبغي اهمالها

واعلم ان فكي الثور البالغ مشتملان على ست وثلاثين سنا منها اربع وعشرون ضرسا كبيرا واربع اضراس صغيرة او بدلية ومنها في الفك الاسفل ثماني اسنان قواطع فقط اما الفك الاعلى فمحتو عن كتلة كبيرة غضروفية قائمة مقام القواطع لتتكء عليها قواطع الفك الاسفل حين قطع الحزمة الحشيشية التي جمعها اللسان تحتها * واذا قابلت اسنان الفرس باسنان الثور وجدت اسنان الثور اقل غلظا وطولا من تلك ووجدت جزءها المنطلق منفصلا عن جذرها بعنق صغير ووجدت نموها اقل من نمو تلك بل قد ينقص في بعض الاحيان ثم يبطل بالكلية فان كانت اسنان الثور اقصر من اسنان الفرس لم يذب منها بواسطة التحاكك مقدار ما يذوب من تلك بل تصابر التحاكك اكثر من تصابر تلك

بيان الاسنان القواطع

هي ثمانية ثابتة في طرف الفك الاسفل ثنتان ثنايا وثنتان رباعية وثنتان وسطوان وثنتان ناجذتان وكل منها تنقسم الى لبنية وبدلية فان اعتبرتها في الحيوان البالغ وجدتها ملسا بيضاء منتهية من الامام بحافة حادة ووجدت جسمها الذي هو الجزء

المنطلق منفرطحا من الامام الى الخلف وتأخذ فى التضايق من حافتها المنطلقة الى سنخها * وهى منفصلة عن جدرها بعنق صغير واضح والسطح الظاهر من جزئها المنطلق محتوعلى خطوط مستطيلة عميقة كالخطوط التى فى اسنان الفرس وتختلف باعتبار عمقها وعددها وقد توجد اسنان شديدة الملامسة فى بعض الاحيان لايظهر فيها اثر خط قط وكلما تقدمت السن فى الذوبان نقص طول جسمها وعرضه مع بقاء بياضها على حاله ولا تأخذ فى الصفرة الامن ابتداء عنقها حين صار جدرها متخلخلا عاريا بارزا فى الظاهر واذا بحثت عن الاسنان القواطع البدلية بعد تمام بروزها باشهر بان بلغ الحيوان خمس سنين اوستا (صفحة ٣ وشكل ٩) وجدتها بيضاء عريضة مختلفة الطول متلامسة باطرافها العليا ومن اجتماعها يتكون نصف دائرة منتظمة نوع انتظام ولا تمكث هذه الاسنان على هذه الاستدارة الامدة يسيرة لان ذوبانها يتلفها بالتدريج ثم تصير كلها اسطحا افقيا وكلما نقص طولها نقص عرضها وبطل تلامسها وتباعد بعضها عن بعض بالتدريج بحيث اذا شاهدتها فى الحيوان الكهل وجدتها متباعدة (صفحة ٣ وشكل ١١ و ١٢)

وقد تقدم ان لقواطع الثور حركة مخصوصة من اعلا الى اسفل تزداد كلما تقدم الحيوان فى العمر والمقصود منها حفظ الوسادة الغضروفية التى للفك الاعلا من ان تجرح من اتكاء الاسنان القواطع عليها حين قطعها الغذاء * وفى اللوح السنى المختص بالبقر جزءان متميزان احدهما حافة حادة والآخر منحدر فالحافة الحادة مكونة لطرف السن ونهاية للسطح المقدم او الظاهر الذى

للسن ووظيفتها قطع النبات النابت فى الارض حين اتكائها على تلك الوسادة الغضروفية فان كانت هذه الحافة بكرا كانت مستديرة فى وسطها بارزة صغيرة ترى كانها اضافية ثم تتلاشى من التحاكك ثم تصير مستقيمة وتزول حادتها وهذه التغيرات هى الذوبان فى الواقع (صفحة ٣ وشكل ١٠ ا و ب و ث و د) ثم ان ذوبان الحافة السنية لا يحصل دفعة واحدة فى جميع الاسنان القواطع بل يحصل بالتدريج فيحصل اولا فى الثنايا ثم الرباعية ثم الوسطى ثم النواجذ فان ذوبانها متأخر عن ذوبان سائر الاسنان ثم بعد ذلك تنمسح جميع تلك الاسنان من حافاتها الحادة فتقصر بحيث تتساوى ولاجل هذه الحال التى اكتسبها صف الاسنان القواطع سمى الحيوان عند العوام حينئذ بالحيوان الذى تم انمساح اسنانه (شكل ١١) كما سمى عندهم بذى الاسنان المستديرة حين صارت اسنانه كنصف دائرة منتظمة (شكل ٩) والمنحدر التى هو بمنزلة القرطاس السنى الذى للفرس مكون لجميع السطح الباطن الذى لجسم الاسنان القواطع وهذا الجزء موضوع على سطح شديد الانحراف وممتد من الحافة الحادة الى عنق السن ومحدود من هذا العنق بحافة حادة ومحتو على تلمين مستطيلين (شكل ٣ والف والف) يترآن كانهما مصنوعان بآلة حافرة ثم ان الجوهر الطلائى الساتر لذلك الجزء طبقة رقيقة جدا شفافة يرى منها لون الجوهر العظمى الذى تحتها وحيثما كان الذوبان يبتدى دائما من الحافة الحادة ومن الامام الى الخلف اتلف الجوهر الطلائى بالتدريج ثم التلمين ثم جميع الجزء المنحدر فيصير اللوح السنى حينئذ ممسوحا * وقبل

ان يتم انصماحه يترك بقرب الحافة الحادة شريطا معترضا صغيرا جدا مختلف اللون يقرب بواسطة الذوبان من وسط اللوح السنى فيعترض ثم يصير مربعا ثم مستديرا ويحتوى مدة طويلة على حاشية بيضاء * وهذا الشريط الشبيه بالنجم السنى الذى للفرس يمكث الى ان تسقط السن * وينبغى الانتباه الى مايعتريه من التغير فانه مهم فى معرفة عمر الحيوان ثم ان جدر الاسنان القواطع (شكل ١ و ٢ و ٣ وب) مستقيم قريب من الشكل الاسطوانى مجوف الباطن يرى كانه مقطوع الطرف وتجويفه المنفرد ليس الا انبوبة طويلة كبيرة محتوية على الجوهر اللبى تضيق فى زمن الشيخوخة بحيث تصير مجرى ضيقا

والاسنان القواطع اللبنية قد تخالف الاسنان البدلية مخالفة شديدة فى جملة امور فانها فى الغالب اضيق واصغر من تلك وانها لا تكون حين تجردها عن اللثة الا فضلات صغيرة جدا هى فى الواقع اجسام غريبة وانها حين سقوطها يعقبها بروز الاسنان البدلية

والاسنان القواطع التى للعجل المستكمل الاسنان الجنينية مكونة جزئى دائرة (شكل ٤) احدهما فى الجهة اليمنى من الفم والآخر فى الجهة اليسرى وكلاهما منفصل عن الآخر بفرجة بين الثنايا ثم ان كلا من الاسنان الاربع التى فى كل جزء منهما منحن ومتجه الى الجهة الوحشية * وكل واحدة منها تكون مروحة صغيرة منتهية بحافة حادة وكما تقدم العجل فى العمر ترى اسنانه القواطع منتصبة متقاربة ثم تتلاصق فهذا التغير الوضعى ناشئ عن كون الاسنان منحنية الاطراف بحسب الاصل وينقص

تباعدها بحسب انمساح جسمها السني
وجدور الاسنان الجنينية شبيهة بجدور الاسنان البدلية وتتغير
حين نمو الاسنان البدلية في باطن الفك تغيرا يفضي الى تلفها
بالكلية فلم يصل اليها غذاء فتقذف حينئذ الى الخارج او تكون
جزأ غريبا يضيق منه الحيوان

بيان بزور الاسنان وذوبانها

اعلم ان الاسنان القواطع التي للثور يعرف منها عمره ما دامت
قائمة بوظائفها وتبرز في مدة معلومة لا تختلف الا قليلا وتتلون
ما دامت موجودة تلونا مختلفا بحسب درجة ذوبانها والواقع ان
هذا التلون لا ينبغي جعله قاعدة مطردة لمعرفة عمر الحيوان
كبروز الاسنان لان بعض هذه التغيرات قليل الوضوح وبعضها
فاحش لا يمكن الطبيب ان يعرفه معرفة تامة حتى يأمن الغلط
ولا شك ان بروز الاسنان القواطع من اسنختها يحصل في مدد
معلومة معينة كما تقدم * وقد يتقدم او يتأخر باشهر بحسب
تركيب الحيوان ونموه تماما فان الحيوان الذي علف علفا جيدا
واسرع نموه تبرز اسنانه بسرعة وماذلك الا من سرعة نموه
بخلاف الحيوان الضعيف الهزيل فيبطئ بروز اسنانه وكذلك
الحيوان الذي استعمل في حال صغره في اعمال شاقة فلا تظهر
اسنانه ظهور الأتقا * وقد ذكرنا في التشريح الاول البيطري
الذي الفته في سنة ١٨٠٧ مسيحية كيفية بروز اسنان جميع انواع
الحيوان الاهلي واوضحناها في جدول وان الملحوظات التي
اكتسبناها بعد تؤيد ما ذكرناه لاسيما في الاسنان القواطع
التي للثور

ثم ان الاسنان القواطع البدلية تبرز معترصة بطرف دقيق حاد بعد اتخاذها طريقا من وسط العظام واللثة وكلما ارتفعت وطالت قل انحرافها واصطفت واخذت بالتدريج وضعها الطبيعي

بيان بروز وانمساح القواطع اللبنية

تبرز هذه الاسنان بعد الولادة بمدة يسيرة ويتم بروزها بعد خمسة عشر يوما فاكثر الى عشرين * والغالب ان العجول تولد بثناياها ورباعيتها وقد تولد مستكملة الاسنان القواطع وقد تكون نواجذها حينئذ معدومة * ومن الحيوان ما يولد بدون ان يبرز شيء من اسنانه ثم تبرز ثناياه ورباعيته بعد مولده بيومين او ثلاثة اما اسنانه المتوسطة فتبرز من اليوم الخامس الى التاسع واما نواجذه فتبرز من اليوم الثالث عشر الى اليوم التاسع عشر * واما العجول التي تربى في مرابي الحيوانات الاهلية فتستدير اسنانها اللبنية من الشهر الخامس الى الشهر السادس وتستمر ثابتة من الشهر الثامن عشر الى العشرين ثم تأخذ في السقوط واول ما يسقط منها الثنايا ثم الرباعية ثم الوسطى ثم النواجذ وهي الاخيرة

وقد ذكرنا ان الاسنان لا تذوب الا بالتحاكك فان منع هذا التحاكك منع الذوبان ومما يؤيد ذلك ان اسنان العجول التي تعطى للقصابين فيغذونها من اغذية مائعة فقط تستمر بدون ذوبان لانها لا تحتاج الى مضغ هذه الاغذية فلم يحتك بعضها ببعض بخلاف العجول التي تغتذى من اغذية ليفية فانها تحتاج الى مضغ شديد فلهذا يظهر في اسنانها علامة الذوبان حيز شروعها

فى الاكل من تلك الاغذية ولاشك ان شدة هذا الدوبان ناشئة عن شدة المضغ ويبتدى من الحافة الحادة ثم يعترى الجزء المنحدر ثم اللوح السنى * واول ما يتحاكك من الاسنان الثنايا ثم الرباعية والوسطى ثم النواجذ لكن قد يختلف سير ذلك الذوبان اختلافا كثيرا فتارة يتقدم وتارة يتأخر بحسب القانون الصحى والغذاء والطبيعة المختصة بالجوهر السنى فان اسنان بعض الحيوان ينقص منها كمية من جوهرها واسنان بعض اخر لا ينقص من جوهرها شئ مع ان هذين البعضين قد يكونان متحدين فى القانون الصحى وقد تمسح الرباعية والوسطى مع الثنايا فى آن واحد * واما ما كان فقد عرف مقدار ما يمسح من ثنايا العجول المتربية فى مربى الحيوان الاهلى وكيفية امساحها تحصل بانتظام من الشهر السادس الى الشهر السابع وقد يشاهد فى هذه المدة عنق هذه الاسنان وتنخفض حافاتها الحادة انخفاضا ما فتصير اخفض من حافات الرباعية ثم ان اهل الاقاليم المشتغلين بتربية الحيوانات الاهلية كاهل اقليم اوبروبا واقاليم ليموزان يسمون العجل الذى بلغ من العمر سبعة اشهر بالشاب ويسمون العجلة حينئذ بالشابة * ومن الشهر الحادى عشر الى الثالث عشر تسامت الرباعية الثنايا بحافاتها الحادة اما الحافات الحادة التى للاسنان الوسطى فاعلا من حافات تلك وفى هذه المدة ترى الرباعية منمسحة

وفى الشهر السادس عشر تسامت الوسطى الرباعية ويتم امساحها فتصير الثنايا حينئذ قصيرة عارية متخلخلة بل قد تكون معدومة ويبقى محلها خاليا ثم تصير جميع الاسنان القواطع

اللبنية مهترئة تالفة نوع تلف وان وجدت الثنايا فى المدة المذكورة كانت على هيئة قطع صغيرة من الاسنان التالفة غير ثابتة فى اسنخها سهلة القلع جدا اما النواجذ فى هذه الحال فالغالب انها اقل تلفا من غيرها

بيان بروز وذوبان القطع البدلية

متى بلغ الحيوان من العمر تسعة عشر شهرا فاكثر الى واحد وعشرين ظهرت ثناياه البدلية فى محل ثناياه اللبنية (شكل ٦) معترضة ملتصقا بعضها ببعض التصاقا شديدا ويسمى الحيوان حينئذ عند العوام بالحيوان الذى ظهرت ثناياه وتسمى انثى البقر بقرة وذكره ثلاما دامت اعضاء تناسلها موجودة واذا بلغ الحيوان سنتين ونصفا فاكثر الى ثلاث سقطت رباعيته وخلفها غيرها (شكل ٧) ومتى بلغ من العمر ثلاث سنوات ونصفا الى اربع سقطت اسنانه المتوسطة اللبنية وخلفها غيرها (شكل ٨) وبروز النواجذ يحصل من اربع سنوات ونصف الى خمس ويصير صف الاسنان القواطع فى السنة الخامسة فاكثر الى ست مستديرا (شكل ٩) والعادة الجارية بين تجار البقر ان الثور او البقرة متى اصبحت اسنانه القواطع بان ذابت حافاتها الحادة انخفضت وصارت كسطح افقى وقد ذكرنا آنفا ان المسح يبتدئ من الحافة الحادة ثم يمتد حتى يصل الى الجزء المخدر فيتلفه بالتدريج ويستمر انمساحه سنوات لشدة طوله وانحداره ومتى تم انمساحه تلف بالكلية

وقد ينشأ عن زوال الجوهر السنى عقب التحاكات نوعات كثيرة مهمة ينبغى لنا الاعتناء بها لئلا من الغلط ما امكن وقد يسرع

الانمساح فى بعض الاحيان فيصيب ازواجا من الاسنان معا وقد يبطىء نوع ابطاء او يحصل بنوع اختلال فاذن ثنايا البقر ورباعيته واسنانه الوسطى المرتفعة ارتفاعا زائدا على العادة لاتذوب الا من اطرافها وهذا الاختلاف المختص بصنف من اصناف البقر يجعله مختلا ثم ان الحيوانات التى تغتذى من النباتات اللينة وهى فى اصطبلاتها الاتحتاج الى كثرة مضغ فلهذا يتأخر انمساح اسنانها فاذا بحث عن عمرها حينئذ ظن انها اقل عمرا مما هى عليه فى الواقع بخلاف الحيوانات التى تغتذى من العشب النابت فى المراعى المرملة وغيرها فان جوهرها السنى يفقد منه مقدار كثير واذا توصل فى اسنانها ظن ان عمرها اكثر مما هى عليه فى الواقع * وينبغى لنا ان نقول ان سرعة انمساح الاسنان وبطوءه ناشئان عن ذات طبيعة جوهرها التى تركبت منه واعلم ان انمساح الحافة الحادة التى للثنايا يحصل من خمس سنوات ونصف الى ست سنوات وتكون فى هذه الحال اقصر من الرباعية بمقدار خط او اكثر وفى السنة السادسة يذوب جزء كبير من الجزء المنحدر الذى للثنايا ثم يمتد الذوبان الى الجزء المنحدر الذى للرباعية والوسطى ويعترى جزأ قليلا من النواجذ * ويتم انمساح الرباعية من ست سنوات ونصف الى سبع وقد ذاب من جزءها المنحدر ثلثاه * وينمسح اذ ذاك معظم اللوح السنى الذى للثنايا وتأخذ الحافة الحادة التى للوسطى فى الذوبان * وتصير الوسطى بعد سبع سنوات ونصف الى ثمان مشتملة على مثل ما اشتملت عليه الرباعية فى السنة السادسة ونصف السابعة الى تمامها ويتم حينئذ انمساح الثنايا وقد انمسح معظم الرباعية

وفى السنة الثامنة فاكثر الى تسع يتم ذوبان النواجذ وقد ذاب نصف جزءها المنحدر ويأخذ اللوح السنى الذى للثنايا والرباعية فى التقعر الذى يزداد بحسب تقدم الحيوان فى العمر ويترا انه مطابق للتقبب الذى فى الوسادة الليفية التى للفك الاعلى * ومن اول السنة العاشرة الى الحادية عشر يصير النجم السنى الذى للثنايا والرباعية والوسطى مربعا ذا حاشية بيضاء وقد تم انمساح النواجذ وصار القوس السنى منخفضا ومن السنة الحادية عشر الى الثانية عشر يصير النجم السنى مربعا ومحققا فى جميع الاسنان ويتضح تقعر اللوح السنى وتقصر الثنايا ويتباعد بعضها عن بعض ومن السنة الثانية عشر الى الرابعة عشر يستدير النجم السنى ويتضح الذوبان فى الحافة الباطنة ويقطع الدائرة المتكونة من الجوهر الطلائى فتصير هيئتها حينئذ كهيئة نعل الفرس * ويصير فرعاها متجهين الى التجويف الفمى

ومن السنة الرابعة عشر الى السابعة عشر تصير هيئة دائرة الجزء الطلائى الذى للرباعية والوسطى كهيئة تلك الدائرة وتتفرطح جوانب هذه الاسنان فى هذه المدة وتقرب من المثلث ويستمر ذوبانها الى ان يصل الى اعناقها فيتلف جميع جوهرها الطلائى الظاهر ولم يبق الا جدورها التى هى فى الواقع زوائد قصيرة صفر امستديرة متباعدة كما يشاهد فى الشكل الثانى عشر فهذه الحال المتلفة لا تتضح فى الواقع الا فى الحيوان الذى بلغ من العمر سبع عشرة سنة ولا يحصل الذوبان بانتظام دائما فى تلك المدة اعنى من السنة الرابعة عشر الى السابعة عشر فاكثر

فان الثنايا والقواطع التي تكون حينئذ اشد تلفا من القواطع اليسرى او بالعكس وقد يتقلع من الحيوان سن او سنان او اكثر اما بنفسه واما بواسطة عارض ولنذكر مسئلة وهي ان اسنان بعض البقرات المتقدمة في العمر جدا لا تذوب الا من جهة حافاتها الباطنة اما حافاتها الظاهرة اى المقدمة فتصير حادة جدا غير منضغطة انضغاطا شديدا ويأخذ اللوح السني في انحراف شديدا ويميل ميلا شديدا ويستطيل من الامام الى الخلف ومن اعلا الى اسفل ويتبعه النجم السني في اتجاهه ويستطيل معه ومتى انمسحت القنطرة السنية بهذه الكيفة صارت الاسنان طويلة ذات ارتفاع يوقف الشخص حين النظر اليه فان لم يكن عارفا للطب اعتقد ان الحيوان بلغ من العمر اقل مما هو عليه في الواقع فان اردت دفع هذا الغلط والوقوف على الصواب ما امكن فازل بعقلك نصف طول اللوح السني وافرض ان الاسنان ذهب منها هذا المقدار فيبقى معك حينئذ المقدار اللائق بعد ذوبانها المنتظم فتقف على الحقيقة ويزول عنك الشك

بيان الاضراس

هي ثنتا عشرة ضرسا في كل فك ست يمنى وست يسرى وموضوع بعضها بجانب بعض مع الملامسة بدون فضاء بينها وكلها ثابتة في اسنختها بدون تخلخل ويزداد حجمها غلظا وعرضا من اول ضرس الى آخر ضرس وكل قوس من اقواس اضراس الشور مشتمل على ضرسين صغيرتين قائمتين مقام غيرهما احداهما يمنى والاخرى يسرى قريبتين من الاضراس الاول ولا تعرف وظيفتهما معرفة جيدة ومتى ظهرت الضرس الاولى

البدلية انقذفتا الى الخارج * ولاشك ان صف الاضراس المؤخرة منفصل عن الاسنان القواطع بمقدار خمس اباهم وان الاشياء التى تعتبر فى اضراس الثور مقاربة للاشياء التى تعتبر فى اضراس الفرس وتنقسم كتلك الى اضراس لبنية واضراس مستمرة واضراس بدلية وان اضراس الفك الاعلى الذى للثور كاضراس فكه الاسفل فى الغلظ والحجم وان كل صف من هذه الاسنان يكون خطا مقوسا متجها نحو الصدر وان اللوح السنى الذى للاضراس العليا اعرض من اللوح السنى الذى للاضراس السفلى ويكون قوسا منحنيا وضعه كوضع اضراس الفرس * وان سطح ذلك اللوح غير منتظم ومشحون بزوائد متقطعة على هيئة خطوط منحرفة السير واسطحها الجانبية مشتملة على اتلام ومستورة بطبقة قشرية ثخينة جدا شديدة السواد لامعة واحتكاك الاضراس السفلى مع العليا كاحتكاك اضراس ذى الحافر غير المشقوق لكن الذوبان الناشئ عن احتكاك اضراس الثور اقل من احتكاك اضراس الحيوان المذكور

والى الآن لم يتمكن الشخص من معرفة عمر الحيوان من الاضراس التى نحن بصددها لكونها موضوعة فى جوانب الفم وضعا عميقا يعسر مشاهدتها بل قد تتعذر فليست مهمة فلا حاجة للبحث عن ما يعتريها من التغير واما الملاحظات التى اخذت منها من حيث كيفية بروزها فكانت من اضراس حيوانات مسنة والواقع ان هذه الملحوظات ذكرت لاتساع العلم لا لمعرفة عمر الحيوان ثم ان الاضراس الثلاث الاول اللبنية تبرز

قبل جميع الاضراس بعد الولادة بمدة يسيرة اما الاضراس اللبنية الثانوية والثالثية فتنبت قبل الولادة وتثقب اللثة وقد تبرز بعدها بستة ايام فاكثر الى اثني عشر يوما * وقد يولد العجل في بعض الاحيان خاليا عن جميع الاضراس وقد يولد بضرسين في كل جانب ثم تتكامل اضراسه اللبنية بعد اسبوعين ثم تتساقط وتخلفها الاضراس البدلية وتحصل هذه التغيرات بهذه الطريقة وهي ان وسطى الاضراس اللبنية تسقط بعد سنة فاكثر الى سنة ونصف وتخلفها الاضراس البدلية ثم تسقط الاضراس الاول بعد سنتين فاكثر الى سنتين ونصف ثم تسقط بقية الاضراس بعد تلك بستة اشهر فاكثر الى سنة اما كيفية بروز الاضراس البدلية فتحصل بهذه الطريقة وهي ان الضرس الاول الذي في مؤخر الاضراس يبرز بعد سنة ونصف وان الضرس الثاني يبرز بعد سنتين فاكثر الى سنتين ونصف وان الضرس الثالث الذي هو تمام الاضراس يبرز بعد ثلاث سنوات فاكثر (لانه قد يبرز في بعض الحيوان بعد اربع سنوات وقد شاهدت رأس حيوان بلغ من العمر اربع سنوات ولم اجد فيه ذلك الضرس فعلمت ان الاضراس لا يعول عليها في معرفة العمر) وبروز الضرس الصغير يحصل بعد مضي عشرة اشهر من الولادة فان بلغ الحيوان سنة وجد فيه هذا الضرس لا محالة ويستمر الى بروز الضرس الاول فحينئذ يرزدفعه الى الخارج

بيان القرون الجبهية

هي آلة يدفع بها الحيوان عن نفسه ما يؤذيه وهي موضوعة في اعلا جانبي الجبهة ومتحدة الهيئة والتركيب ولا يخالف

احدها الآخر فان حصل بينها تغاير فى الطول او الغلظ او التوازى او الالتواء كان ذلك ناشئا عن خلل عارض لا محالة

ولا تتضح هذه القرون الا بعد الولادة وتنمو بسرعة مدة ما ثم تكتسب طولا يختلف باختلاف اصناف الحيوان وباعتبار وجود اعضاء التناسل وعدمها فمتى تمت وانفحت نوع اتضاح فالغالب انها ترتفع وتميل الى جهة الامام واذا تأملتها وجدت اسافلها اغلظ من اعاليها التى هى مختلفة الدقة وكلها منتهية باطراف دقيقة * واسطحها املس واما مائلة الى البياض وذلك باختلاف لون الحيوان وبعضها صدفى وبعضها كدر وبعضها لامع واصلها القريب من الجلد ذو مرونة تجعله يحس بتأثير النير اى الناف وتأثير الحبل الذى ثبت به الناف على الكتف بعد ربطه فى القرون ثم ان القرون الطويلة المنحنية انحناء جيدا تزين الرأس وتجعل الحيوان ذا هيئة جميلة كالثوار اقليم اونجرى واقليم رومى فانها اجمل من غيرها * وهنا لصنف آخر من الاثوار خال عن القرون اجتهد الفرنساويون فى تكثيره فى بلادهم وصار له شهرة عظيمة حين دخوله فى بلاد اوروبا والآن هجر وصار مذموما عندهم وقرون فحول البقر لامعة متوسطة الطول مائلة الى الامام ثم بعد الخصى تأخذ فى الاتضاح وتزداد طولا وترتفع ومتى خصى الفحل صغيرا زاد قرنه طولا ونقص لمعانه والغالب ان اصل قرون فحول البقر وخصيها اغلظ واقوى من قرون اناثه

واذا اعتبر الجزء القرنى من حيث هو بعد انفصاله عن الجبهة

لم يكن الاساقاطو يلا بجوفا مخروطا على زائدة عظمية تسمى عند العوام بالمرود والصواب تسميتها بحمالة القرن * ولاشك ان تركيب القرن كتركيب الشعر فهو عبارة عن جملة قراطيس متداخلة هى الياف مستطيلة متلاصقة تلاصقا تاما ثم ان السطح الباطن من هذا القرن محتوعلى ثقوب صغيرة كثيرة غير منتظمة وعيسة وتنفذ فى باطن الجوهر القرنى لتوزع العصارة المغذية

وبعد مدة يسيرة من ولادة العجل يأخذ القرن فى النبت ويعرف ذلك باللمس ويبرز على هيئة ارتفاع غليظ مستور بشعر منتصب متباعد بعضه عن بعض ومتى بلغ الحيوان من العمر ثمانية ايام فاكثر الى عشرة يتضح اصل ذلك الارتفاع ويكتسب اللون الذى يكون القرن عليه مدة حياة الحيوان * ومتى بلغ الحيوان عشرين يوما يزداد الارتفاع المذكور ويجاوز الجلد ويكون فى الحقيقة قرينا مرنا الملمس الطرف

واذا بلغ الحيوان خمسة اشهر اوستة اكتسب هذا القرين قوة واخذ فى الانحناء واستر سطحه باستطالة من البشرة وصار كدرا قشريا غير منتظم وهذه الاستطالة البشرية كالصفيحة الطفلية البشرية السائرة لحائط حافر المهرحين ولادته وتستمر الى ان يبلغ الحيوان سنة ثم تأخذ فى التقشر من اربعة عشر شهرا الى خمسة عشر ثم تسقط اما على هيئة قشور واما على هيئة صفايح فيظهر حينئذ القرطاس الذى تحتها * ومتى سقطت صار سطح القرن المذكور املس لامعا واكتسب قوة مخصوصة ومتى بلغ الحيوان عشرة اشهر اوسنة صار اصل ذلك القرن عقديا وانضحت

دوائره التي يستدل بكل واحدة منها على بلوغ الحيوان سنة وهذه الدوائر تبتدي من ذات اصل القرن ثم يتباعد بعضها عن بعض بمعنى ان الدائرة القديمة هي التي تكونت اولا وبعدت عن الجلد وتظهر تلك الدوائر بانخفاض مستدير وتحدث في اصل القرن بقرب الجلد وبين كل دائرتين عشرة اشهر فاكثر الى سنة والغالب ان تلك الدوائر قليلة الظهور والدائرة الاولى محددة للقرطاس الاول وبها يستدل على ان الحيوان بلغ من العمر سنة وكل دائرة من الدوائر التي تأتي بعدها تنفصل عن ماقبلها بانخفاض قليل الوضوح

واذا بلغ الحيوان من العمر عشرين شهرا فاكثر الى سنتين فقد يحدث في اصل قرنه انخفاض قليل جدا او حلقة لا تخالف الحلقة التي قبلها الا في شيء يسير وتحدد الجانب الباطن من الدائرة الاولى فيستدل حينئذ على بلوغ الحيوان سنتين وقد لوحظ ان الدائرة الاولى تمسح وتصير قليلة الوضوح حين دخول الحيوان في السنة الخامسة ومتى بلغ الحيوان من العمر سنتين ونصفا فاكثر الى ثلاث فقد يتضح في قرنه حلقة اظهر من الحلقتين السابقتين استدل بها العوام على ان الحيوان قد بلغ وهي محددة لاصل القرن والجانب الباطن في الحلقة التي تحدث بعد سنتين

وفي ثلاث سنوات ونصف الى اربع قد تنفصل من اصل القرن حلقة ثالثة واضحة الغلظ جعلتها تجار البقر اول حلقة تحدث في القرن وتنفصل عن الجلد بانخفاض خفيف جدا وترى انها طردت الحلقتين السابقتين اللتين تزولان فيما بعد وتبقى

وحدها

وفى اربع سنوات ونصف الى خمس قد تتضح فى اصل القرن حلقة اخرى شبيهة بالحلقة التى تحدث فى السنة الرابعة ثم تظهر فى كل سنة حلقة فحينئذ يستدل بكل واحدة على سنة من عمر الحيوان وبالجملة ففى كل سنة من عمر البقر يحدث فى قرنه حلقة الى آخر عمره وان اردت عدها فابدا من اعلى القرن فالحلقة الاولى تدل على سنة والحلقتان على سنتين وهلم جرا ولا يذهب عليك ان الحلقتين الاوليين تكونان فى السنة الرابعة قليلتى الوضوح وتزولان بالكلية فى السنة الخامسة وحيثما كانت الحلقة التى تحصل فى السنة الثالثة مستمرة واضحة امتنع الغلط

ثم ان الطرائق المتقدمة التى يعرف بها مقدار ما مضى من عمر الحيوان قد تختلف فى بعض الاحيان لانها مبنية على اصول قابلة للتغير فقرون الحيوانات الهزيلة الضعيفة يكون نموها ضعيفا مثلها فتتغير تغيرا متنوعا فلا يستدل بها على العمر وليست علاماتها الا نتايج مختلة غير قوية فى معرفة العمر

والحلقات التى تحدث فى اربع سنوات وخمس وست وسبع وثمان تتوالى بانتظام والغالب انها واضحة بخلاف الحلقات التى تحدث بعدها فغير واضحة لا سيما فى اناث البقر لان هذه الاناث متى جاوزت ثمانى سنوات انفضت اصول قرونها وتقاربت دوائرها واختلطت جملة منها بعضها ببعض وصارت فى اواخر الامر خشونة غير منتظمة لا يتمكن بها الشخص من معرفة عمر الحيوان ولان تلك الاناث متى بلغت سن الكهولة انعوجت

قرونها وانحرفت الى جهات مختلفة وتغيرت تغيرا مختلفا اما قرون الانوار المتقدمة في العمر التي تذبح في المذابح التي في بلاد اوروبا فلا يعتريها التغير المذكور ولا تنخفض ولا تصير اصولها خشنة بل تبقى على غلظها الاصلي وقوتها غير ان دوائرها وان كانت غير شديدة الوضوح وغير متساوية مشتملة على اثر قشري يمكن الشخص الممارس للفن ان يعرف به عمر الحيوان ثم ان بعض تجار البقر المقيمين في بعض الاقاليم لاسيما القريبة من باريز قد يجعلون قرون البقر جديدة بحسب الظاهر لترى للمشتري انها حديثة السن وذلك بان ينشروها ويقصروها ثم يبردوها حتى تصير مستوية الاجزاء ثم يأخذوا قطعة زجاج فيمسحوها بها حتى تصير ملسا فان اشتبه هذا الغش على الطبيب فعليه بفم الحيوان ليعرف من اسنانه مقدار عمره وتنكشف له الحال * والحامل لاولئك على فعلهم المذكور ان القرون متى كانت لامعة دلت على كثرة اللبن عند بعض الناس فليحذر ارباب الزراعة المشتغلون بها من ذلك الغش لئلا يغتروا به فتهلك دوابهم

كلام مجمل في معرفة عمر البقر

لا يهتم بعمر البقر الا من سنة ونصف من ولادته الى عشر سنوات لان هذه المدة يباع فيها البقر ويشترى ويطلب منه اعمال مخصوصة اما العجول الصغيرة التي تباع للقصابين فمختلفة القيمة بحسب كثرة سمنها * وقلته فلا حاجة الى معرفة اعمارها لان ثناياها ورباعيتها اللبنية لم تسقط وان سقطت خلفها غيرها بسرعة * والغالب ان الانوار لا تمكث في بلاد اوروبا اكثر من ثنتي عشرة سنة فان اهل تلك البلاد يسمنونها في هذه المدة ويبيعونها

للقصابين فان ابقوها عندهم فقد تعيش اكثر من تلك المدة الا ان قوتها على العمل تتناقص ثم تموت بعارض فان التجربة دلت على ان الحيوان متى جاوز هذا السن خسر فيه صاحبه فلذلك لا يقتنيه تجار البقر فى البلاد المتقدمة ولا يبقون عندهم منه الا افرادا قليلة من الاناث لكونها ذات لبن اوقوية على العمل وايضا قد يعسر سمن البقر واذا اريد تسمينه صرف عليه اموال كثيرة وربما بطل عمله بيع للقصابين

وقد اختصرنا الكلام على ذلك خوفا من السامة والملل

بيان تفصيل عمر البقر

اعلم ان اسنان البقر اللبنية تأخذ فى الظهور من حين بلوغه سنة الى خمسة عشر شهرا فحينئذ تتكامل ثم تسمح الرباعية والوسطى بالتدريج وتذوب الثنايا بالكلية فتصير قصيرة عارية متخلخلة

قرن اما القرن فتظهر فيه فى السنة الاولى حلقة خفيفة وتزول منه صفيحته البشرية بالتدريج

سن واما الثنايا اللبنية فتسقط من سنة ونصف الى سنتين وتخلفها الثنايا البدلية وتسمح الرباعية وتصير مخلخلة فحينئذ يصير للحيوان سنان عريضتان (شكل ٦)

قرن ويظهر فى القرن حلقتان خفيفتان المتأخرة منهما اوضح من المتقدمة ويصير القرن املس لامعا

سن ومن سنتين ونصف الى ثلاث تسقط الرباعية اللبنية ويخلفها غيرها فيصير الحيوان محتويا على اربع اسنان كبيرة والوسطى اللبنية اما ان تكون ساقطة واما ان تكون قريبة من السقوط

(شكل ٧)

قرن ويصير القرن اذ ذاك مشتملا على حلقة كبيرة مستديرة يجعلها العوام علامة على بلوغ الحيوان * وتكون الحلقتان السابقتان قليلتي الظهور

سن ومن ثلاث سنوات ونصف الى اربع تسقط الاسنان الوسطى ويخلفها غيرها من الاسنان البدلية فيكون الحيوان حينئذ مشتملا على ست اسنان عريضة بدلية وتكون النواجذ ساقطة او متخلخلة قريبة من السقوط (شكل ٨)

قرن ويصير القرن محتويا على حلقة كبيرة توهم انها الحلقة الاولى التي تحدث في اصل القرن وليس كذلك وتكون محدودة بحلقتين كبيرتين وتمسح الحلقة التي حدثت حين بلوغ الحيوان سنتين وتصير الحلقتان المحدودتين لها قليلتي الوضوح

سن ومن اربع سنوات ونصف الى خمس تتضح النواجذ ويكون الحيوان حينئذ مستكمل الاسنان وتكون الثنايا والرباعية قد امسحت

قرن ويكون القرن مشتملا على ثلاث حلقات كبيرة الاخيرة منها قليلة الظهور وحينئذ تزول حلقة السنة الاولى وحلقة السنة الثانية بالكلية ولا يبقى في القرن الا حلقتان كبيرتان

سن ومن خمس سنوات ونصف الى ست تأخذ الاسنان في الاستدارة وتمسح الثنايا ويذوب ثلثاها من الجزء المحدد وتذوب الرباعية نوع ذوبان (شكل ٩ و ١٠)

قرن ويصير القرن محتويا على اربع دوائر وثلاث حلقات ولا تتضح دائرة هذه المدة الا في السنة السادسة

سن ومن ست سنوات ونصف الى سبع تصير استدارة الاسنان مختلة وتمسح الرباعية ويبتدئ انمساح الحافة الحادة التى للنواجذ

قرن ويصير القرن محتويا على خمس دوائر وربع حلقات ولا تكون هذه الحلقات بارزة فى الثور وتكون الدوائر المذكورة واضحة فيه بواسطة حلقة قشرية

سن ومن السنة السابعة الى الثامنة يخفض القوس السنى الذى للاسنان القواطع انخفاضا واضحا وتمسح الوسطى وتذوب

قرن الثنايا والرباعية ويكون فى القرن ست دوائر وخمس حلقات وتكون الحلقتان الاخيرتان منها ضيقتين

سن ومن السنة الثامنة الى التاسعة يخفض القوس السنى انخفاضا كليا وتمسح النواجذ وتذوب الرباعية والوسطى وتأخذ الثنايا

قرن فى التقعر ويكون القرن محتويا على سبع دوائر وست حلقات تكون فى اناث البقر تالفة على هيئة خشونة وتكون فى ذكوره على هيئة قشور

سن ومن السنة التاسعة الى العاشرة يقصر القوس السنى بالتدريج ويذوب معظم الاسنان وتصير الثنايا مربعة ويتضح تقعرها وتقعر الرباعية اتضاحا شديدا

قرن ويصير القرن محتويا على ثمانى دوائر وعلى سبع حلقات متغيرة تغيرا شديدا

سن ومن السنة العاشرة الى الحادية عشرة تقصر الاسنان قصرا شديدا وتذوب النواجذ ويذوب القوس السنى بالكلية ويصير النجم السنى الذى للثنايا والرباعية والوسطى مربعا مرتفع

الحافات

قرن ويشتمل القرن اذ ذاك على تسع دوائر وثمانى حلقات وينخفض اصل قرون اناث البقر وتختلط دوائرها بعضها ببعض وتفسد هذه القرون افسادا عاما

سن ومن السنة الحادية عشر الى الثانية عشر تصير الثنايا عارية ويتقعر اللوح السنى تقعرا واضحا ويصير النجم السنى مربعا ذا حافة مرتفعة فى جميع الاسنان القواطع

قرن ويصير القرن مشتملا على عشر حلقات وتسع دوائر والغالب انها قليلة الاتضاح

سن ومن السنة الثانية عشر الى الرابعة عشر تصير الاسنان القواطع قصيرة جدا متباعدة غاية التباعد وقد ذابت ذوبانا شديدا ولم يبق منها بدون ذوبان الا اعناقها ويكون نجمها السنى مربعا ذا حافة مرتفعة ويصير الجوهر الطلائى الظاهر الذى للثنايا على هيئة نعل الفرس فى السنة الثانية عشر والثالثة عشر ويتضح ذلك فى الرباعية والوسطى فى السنة الرابعة عشر

قرن ويصير القرن مشتملا على احدى عشرة دائرة اواثنى عشرة وتنقص حلقة ولا تكون هذه العلامات واضحة فى هذه المدة بل قد يتعذر عدها

سن ومن السنة الرابعة عشر الى السابعة عشر تتلف اجسام الاسنان بالتدريج تلفا مختلا وحتى وصل الى اعناقها صارت كفضلات صغيرة صفراء مهتزة وقد يسقط من الحيوان حينئذ سن اوسنان او اكثر

قرن وتختلط دوائر القرن بعضها ببعض اختلاطا شديدا وتصير

كحشونة فى اناث البقر التى تلفت قرونها والتى قرونها معوجة

الفصل الثانى فى عمر الضأن

اعلم انه لما دخلت الغنم المارينوسية فى الديار الفرنساوية التفت اليها اهلها التفاتا عاما وبحثوا عن جميع احوالها وكتبوا فى شأنها من حيث تربيتها كتابة مختلفة ومن حيث فوائدها وقد خصص معظم المؤلفين لعمر هذه الغنم الجميلة الثمينة فصلا ومن هذا المعظم المؤلف دوبانتون الذى هو اول من تكلم على عمر تلك الغنم فى رسالة مختصة برعاتها وارباحها وذكر فيها العلامات التى بها يعرف عمرها من حين ولادتها الى بلوغها خمس سنوات وهذه العلامات مبنية على مشاهدات وعمليات دقيقة لم يترك منها ذلك المؤلف الماهر شيأ ولم يزد غيره من المتأخرين شيأ من عنده بل نقل كلامه بالحرف الواحد

ثم ان الاسنان القواطع من اجزاء البنية وبها يعرف عمر الضأن وذكر الحكيم المتقدم انه متى بلغت الشاة من العمر خمس سنوات امكن معرفة بقية عمرها من اضراسها وذكر ايضا ان هذه الاضراس متى كانت ذاتية ضحكة علم ان الحيوان متقدم فى العمر وهذه القاعدة الدقيقة تحتاج الى توضيح زائد وقد بحثنا عنها لتأكدها وتحققها وبيان منشأها وليعرف من اين جاءت ذلك المعلم فقابلنا جملة من اضراس فكولئ متعددة ببعضها ببعض من حيوانات بلغت من العمر خمس سنوات فلم نشاهد فيها تغيرات منتظمة ولا الوانا واضحة فنعرف منها ما زاد على هذه المدة فان كان الامر كما ذكره المعلم المذكور لزم ان تكون تلك العلامات المتخذة من تلك الاضراس واضحة مع انها غير واضحة

لكون الاضراس موضوعة فى اقصى الفم ولاشك انه يعسر فحصه والاطلاع عليها وقد اختصرنا الكلام على الاضراس فلم نبين سوى كيفية بروزها ووضعها الظاهر وتكلمنا ايضا على قرون الضأن وذكرنا الفرق بينها وبين قرون البقر والتغيرات التى تعتريها فى مدة الحياة

بيان الاسنان القواطع

الفك الاسفل الذى لذوات الصوف مشتمل على ثمانى اسنان قواطع كالفك الاسفل الذى للبقر منها ثنتان ثنايا وثنتان رباعية وثنتان وسطى وثنتان نواجذ وكلها موضوعة ومصفوفة كوضع وصف اسنان البقر ويعتريها من التغيرات ما يعترى تلك وتنقسم الى لبنية وبدلية وبالجملة فهى كاسنان البقر من كل وجه ما عدا اشياء واهية ينبغى معرفتها وهى انها اذا اعتبرت فى الحيوان البالغ وقد اكتسبت طولا ما كانت عريضة هرمية الشكل واذا اعتبرتها من ابتداء حافاتها الحادة الى اللثة وجدتها رقيقة وهذه الاسنان وان كانت عديمة الاعناق اكثر ارتفاعا وحادية من اسنان البقر وكلها ثابتة فى اسنختها بدون تخلخل وليست متحركة من اعلى الى اسفل بخلاف اسنان البقر فهذه الاختلافات الشديدة الوضوح يعرف بها لماذا امكن الضأن قطع الحشيش من قرب جذره وقلع بعض نباتات واتلاف بعضها وبعض المراعى بخلاف البقر لغلظ شفاهه ولكونه يجمع علفه على هيئة حزم ولا يقطع منها الا اطرافها ولم يتلف شيأ من المراعى

والغالب ان الاسنان القواطع التى نحن بصددها اقل بياضا من

اسنان البقر وان حافاتها سود لاسيما القريب من لثاتها ويستمر هذا اللون فى التلم الصغير الحامل للجزء المنحدر من لوحها السنى ثم ان القواطع اللبنية التى للغنم اضيق واقصر من اسنانها البدلية فبذلك قسمها الحكيم الشهير دوبانتو قسمين احدهما حادلبنى والآخر عريض مفرطح بدلى وكلاهما ثابت فى سنخه بدون تخلخل مدة تامة ثم يتخلخل حين تعريته ثم يقذف معظمه الى خارج العظم الفكى فهذا الاهتزاز يسبق سقوطها ويزداد شيأ فشيأ حتى تسقط السن بنفسها

بيان بروز وانمساح الاسنان

لاشك ان الشاة تولد غير مستكملة اسنانها القواطع مع ان ثنايا ها بارزة خارجة عن اسنخها مستورة باللثة التى تكون فى بعض الاحيان ساترة للرباعية التى هى اقصر فى بعض الاحيان من الثنايا ومتى بلغت من العمر خمسة وعشرين يوما كملت اسنانها القواطع وتمكث ثابتة سنة فاكثر الى سنة ونصف ثم تسقط وتخلفها غيرها وتكتسب فى مدة ثباتها بياضا وتستطيل وتدوب نوع ذوبان باعتبار مرعاها ثم بعد مضى شهرين فاكثر الى ثلاثة اشهر تستدير الاسنان المذكورة وتصير قسمين كدائرتى اسنان العجل ولا يتضح ذوبانها الا اذا اكلت الشاة اغذية لينة وكلما كانت هذه الاغذية كثيرة الليف ازداد الذوبان وضوحا لكن لما كان تغيره غير منتظم لم يعرف منه مقدار عمر الشاة ولنذكر مثالا وهو ان ذوبان الاسنان اللبنية ليس مهما لان من المعلوم ان الشخص يمكنه تمييز الشاة التى بلغت من العمر اربعة اشهر او ستة عن الشاة التى بلغت عشرة اشهر او سنة وليس هذا التمييز من كبر

حجمها فقط بل من اسنانها القواطع ايضا فالشاة التى بلغت اربعة اشهر فاكثر الى ستة تكون اسنانها القواطع كاملة سليمة بخلاف الشاة التى مضى عليها عشرة اشهر فاكثر الى سنة فان اسنانها تكون عارية تالفة وثناياها مهتزة قريبة من السقوط ومن خمسة عشر شهرا الى ثمانية عشر تبدل الثنا اللبنية بثنايا اخرى وتبرز فى الخارج منحرفة بطرف دقيق انحرافا اقل من انحراف اسنان الثور ومتى دخلت الشاة فى السنة الثانية سميت حولية (صفحة ٤ شكل ٢) وتصير مسماة بهذا اللفظ الى بروز اسنانها الرباعية

ومن الشهر العشرين الى السابع والعشرين تسقط الرباعية وتخلفها الرباعية البدلية ففى هذه المدة (شكل ٣) لا يسمى الذكر المعد للنطاح بالحولى بل يسمى كبشا واذا خصى ذكر الضأن سمى خصيا وتسمى الانثى نججة وقد تبرز الرباعية والوسطى والثنايا معا فى الحيوانات السريعة النمو وهى الذكور لا الاناث

ومتى بلغت الشاة ثلاث سنوات ونصفا سقطت اسنانها الوسطى وخلفها غيرها وقد تسقط معها الرباعية فى بعض الاحيان (شكل ٤)

واذا بلغت اربع سنوات او اربعا ونصفا سقطت نواجذها اللبنية وخلفها نواجذ اخر (شكل ٥) وقد تسقط النواجذ مع الوسطى لكن لا تبرز النواجذ الا بعد بروز الوسطى فحينئذ تصير اللثة خالية عن النواجذ مدة ما ومن الحيوان ما لا تعود له نواجذه فيمكث فوه السنى خاليا عنها مدة حياته ويصير مشمّلا

على ست اسنان فقط

ومتى كمل بروز الاسنان القواطع البدلية استطالت وذابت وتغيرت تغيرا مختلفا وقد تستديرمن السنة الخامسة الى السادسة وتذوب كما تذوب اسنان البقر بمعنى ان حافتها الحادة تمسح ثم يمسح جزءها المحدر ثم يذوب جميع لوحها السني هذا وان العادة الطبيعية ان امساح الثنايا يحصل دائما قبل امساح الرباعية والوسطى فيكون الحيوان حينئذ بلغ من العمر ست سنوات وان امساح الرباعية بعد امساح الثنايا فيكون الحيوان قد بلغ من العمر سبع سنوات وان امساح الوسطى يحصل فى السنة الثامنة وامساح النواجذ فى التاسعة والواقع ليس كذلك فان امساح الاسنان القواطع الناشئ عن تحاكك بعضها ببعض قد يختلف سيرها اختلافا شديدا فلا يرى حيوان امسحت اسنانه القواطع امساحا جيدا من اول امساح الثنايا الى آخر امساح النواجذ لان الغالب ان الثنايا تمسح قبل بروز الرباعية وان الرباعية تمسح قبل بروز الوسطى وان اسنان السنتين واسنان الثلاث قد تذوب قبل استدارتها وبالجملة فالتغيرات التى تعترى الاسنان بعد تمام بروزها مختلفة جدا فلهذا لا يقف الشخص على حقيقة مقدار عمر الحيوان لكن قد تكفى هذه العلامات فى بعض الاحيان لمعرفة عمر الحيوان اذا صار كهلا او قريبا من خمس سنوات ففى هذه الحال الاخيرة تكون نواجذه قصيرة سلمية او قليلة التلف ومتى جاوز خمس سنوات استطالت نواجذه ومتى بلغ ست سنوات صارت مساوية للرباعية والوسطى فان كان امساح الرباعية والوسطى

غير دال على بلوغ الحيوان سبع سنوات كانت حال نواجذه دالة على انه فى اثناء السابعة او انه قرب من السنة التاسعة فان اللوح السنى الذى للنواجذ يكون فى هذه المدة منمسحا وكذلك القوس السنى وقد يمكن الاستدلال على هذا العمر حال الثنايا والرباعية لانها قد تتعرى وتأخذ فى التخلخل حين بلوغ الحيوان ست سنوات

وقد ذكرنا ان امساح اللوح السنى الذى لقواطع الضأن يعتريه تغيرات كثيرة الا ان بعضها يحتاج الى التفات مخصوص فالحيوانات التى ترعى فى مراع جافة او ارض ذات حشيش قصير صلب تكون ثناياها فى الغالب متباعدة بمسافة مثلثة كذنب الخطاف المسمى عند العوام بعصفور الجنة وهذه المسافة موجودة بين الحافات الباطنة التى لتلك الاسنان (شكل ٦ والف) ويمكن مشاهدتها مدة حياة الحيوان لكن الغالب لا تظهر الا بعد اربع سنوات فاكثر الى ست سنوات من الولادة وليست الاعارض لا يستدل به على شئ من عمر الحيوان

واعلم ان قوس قواطع الشاة قد تعتريه حالان مختلفتان احداهما افراط الطول والاخرى افراط القصر فالحال الاولى لا تتضح فى الحيوان الا بعد بلوغه ست سنوات وهى فى الحقيقة ناشئة عن شدة بروز السن واستمرار نموه الى سقوطها بحيث لا يذوب لوحها السنى * ومتى جاوز الحيوان سبع سنوات تعرت اسنانه القواطع ثم اهتزت ثم سقطت بنفسها وقد تقصر اطراف تلك الاسنان ثم تتقارب وترى متجهة نحو وسط الفك فتجعل القوس السنى قصيرا

والحال الثانية وهى افراط القصر اقل وضوحا من سابقتها لكونها ناشئة عن ذوبان تلك الاسنان بالتدريج حتى يصل الى اللثة فالحيوان الذى ذابت اسنانه بالكلية لم يبلغ من العمر اكثر من عشر سنوات مع ان العلامات التى تحدث بعد الذوبان المذكور تدل على انه بلغ من العمر خمس عشرة سنة ثم ان العلامات الدالة على ان سنا من القواطع او اسنانا منها انكسرت او سقطت بعارض تجعل الحيوان ناقص الاسنان ويمكن حصول هذا العارض فى مدة الحياة الا ان وجوده فى الحيوان الكهل اكثر من وجوده فى الحيوان الحديث

بيان الاضراس

هى اشبه باضراس البقر ونظامها كنظامها ولا تخالفها الا فى شئ يسير وكل صف من صفوفها مركب من ستة اضراس موضوع بعضها بجانب بعض مع التزاحم واضراس الفك الاعلى اقوى واغلظ من اضراس الفك الاسفل ثم ان الصف الاعلى على هيئة خط منحن كخط اضراس البقر بمعنى ان تقببة متجه الى الجهة الوحشية نحو الخد وان لوحه السنى مقطوع كهيئة سطح منحن وفيه ارتفاعات غير منتظمة وحفر متوالية وكلها موضوعة على هيئة خط معترض لولبى وان الثلاثة الاضراس الاول اصغر من الاضراس الثلاثة الاخيرة وهى ثلث طول الصف المتقدم وترى الطبقة الطلائية الساترة للاسطحة الجانبية اشد سودا وثخنا من الطبقة التى لاضراس البقر ولا شك ان الضأن محتوى على ضرسين زائدين فى كل قوس كما ان البقر محتوى عليهما وهما ملاصقان للضرس الاول

ويسقطان حين بروز الضرس البدلى الاول
وكل من الاضراس اللبنية والاضراس البدلية تبرز كما تبرز امثالها من البقر مع اتحاد الزمن والنظام وانما الفرق بينها ان بروز كل ضرسين من اضراس الضأن يسبق بروز كل ضرسين من اضراس البقر بشهرين فاكثر الى سنة فلهذا تولد الشاة محتوية على جميع اضراسها المقدمة بخلاف العجل فانها لا توجد فيه الا بعد ولادته بمدة

بيان القرون

الغالب ان ذوات الصوف لا تخلو عن قرون وهى زينة رؤسها لا سيما رؤس الذكور وقد يخلو بعض الضأن عنها وهو صنف مخصوص فى بلاد الانجليز ذو صوف طويل وكل من ذكوره واناثه خال عن هذه القرون وللاغنام المارينوسية التى استوطنت فى الديار الفرنساوية قرون صغيرة بالنسبة للقرون المعتادة

ولا تبرز القرون الا بعد الولادة وتنمو نموا شديدا فى السنة الاولى ثم يقف نموها من حين دخول الشاة فى السنة الرابعة واجزاؤها العضوية كاجزاء قرون البقر احدها حالة اومرود عظمى * وثانيها نسيج شبكى وثالثها قرن ظاهر مكون من قراطيس متداخلة ولا فرق بين هذه القرون وتلك الا فى النمو والهيئة فان قرنى الكبش منحنيان على هيئة حلزون ومحتويان من جميع امتدادهما على غضون او خشونة حلقية تتكون منها دوائر القرن وليست هذه القرون كاسطوانة ملسا بل هى كمنشورى احد اسطحته تابع لتقببه ونموها الذى يمكن استمراره خمس

سنوات قد يقف بالخصى بخلاف قرون البقر فلا يقف نموها بالخصى وتولد ذكور الغنم بدون قرون ولا تبرز الا بعد خمسة عشر يوما من الولادة ومتى ارتفعت من احد جانبى الرأس فقد تجذب معها طبقة من البشرة تأخذ فى التقشر من شهر ونصف الى شهرين من حين الولادة ثم تسقط وتخلفها الخشونة المتقدمة وحين حدوث القرينات ترى كزوائد متحركة ومتى بلغ الحيوان ثلاثة اشهر فاكثر الى اربعة اخذت فى الصلابة شيأ فشيأ حتى تصير جزأ من الرأس

ولم نذكر هنا جميع اوصاف القرون التى نحن بصددها لكوننا افردناها برسالة مخصوصة يعرف منها مقدار ما بلغته الشاة من العمر * واعلم ان التجربات التى اشتغلنا بها فى هذه القرون كانت فى قرون اغنام مارينوسية ولادتها مؤرخة فى دفاتر وقفنا عليها غيرها من سائر اصناف الغنم التى ربيت فى مرعى الزراعة الملكية التى فى رانبوليه

وتعترى قرون الكبوش فى مدة حياتها تغيرات مختلفة كما تقدم فتستطيل ثم تغلظ وتستمر على هذه الحال الى بلوغ الحيوان من العمر اربع سنوات ثم تكتسب فى كل سنة عدة عقد او خشونة ومتى جاوز الحيوان المتقدم خمس سنوات ذهبت لمعتها وتغيرت تغيرا مختلفا يزداد بحسب التقدم فى العمر ونمو القرون المذكورة واضح فى السنة الاولى ويتناقص فيما بعدها الى السنة الرابعة ثم يقف بالكلية وبما تقدم من كيفية نمو القرن يصح تقديره بالاشياء الاتية

ففى السنة الاولى يكون مقدار القرون ١٩ ابهاما فاكثر الى ٢٠

وفى السنة الثانية يزيد مقداره ٥ اباهم فاكثر الى ٠٦
وفى السنة الثالثة يزيد مقداره ٤ اباهم فاكثر الى ٠٤
وفى السنة الرابعة يزداد مقداره ٣ فاكثر الى ٠٣
فيعلم من ذلك ان الشاة اذا بلغت من العمر خمس سنوات فقد
حصل قرنها على طوله الحقيقى ولم يزد بعد ذلك شيأ فيكون
مقداره حينئذ من تسع وعشرين ابهاما فاكثر الى ثلاث
وثلاثين

ولم يعرف تحديد مقدار ما يزداده القرن فى كل سنة بل ما يعرف
على سبيل التخمين هو الخشونة او الدوائر التى تحصل فى كل
سنة وعدتها مقدار ما مضى على الحيوان من السنين وهى ناشئة
دائما عن نمو القرن ففى كل سنة توجد دائرة كما توجد كذلك
فى قرون البقر فاذن يكون القرن فى السنه الاولى مشتملا على
عشرين خشونة فاكثر الى خمس وعشرين وهى اوضح من
الخشونة التى تحدث بعدها غلظا وتباعدا وكلما تقدم الحيوان
فى السن انخفضت تلك الخشونات وتقاربت اما الخشونة التى
تحدث بعدها فى اصل القرن فحتوية على خمس عشرة خشونة
صغيرة جدا فاكثر الى عشرين خشونة غير منتظمة مختلط
بعضها ببعض وقد تتميز هذه الخشونات فى بعض الكبوش
فيعرف منها مقدار عمرها ومن الغرائب ان ما يستدل به على
العمر من القرون مماثل لما يستدل به عليه من الاسنان بمعنى ان
هذه الاسنان اذا كانت سابقة على ما يعرف منها من عمر الحيوان
كانت القرون مثلها ثم ان الخشونة التى تحدث فى السنتين
الاولتين واضحة الصفات مستمرة تسهل معرفتها بخلاف

الخشونة التي تحدث بعد فيعسر تمييز بعضها عن بعض لشدة اختلاطها ولعدم حواجز بينها فلا يمكن معرفة عمر الحيوان من القرون

كلام مجمل في عمر الضأن

الغالب ان الضان يولد في شهر طوبة او شهر امشير وحتى بلغت الشاة حولا قيل لها حولية والبحث عن عمرها حينئذ من اسنانها غير مهم لكون نمو جسمها في هذه المدة كافيا في معرفة ما مضى عليها من الشهور لا سيما اذا كان حال الاسنان القواطع وسقوط الثنايا متأخرين عن تلك المدة او متقدمين عليها سواء برزت الثنايا البدلية ام قرب بروزها

ومن عشرة اشهر الى سنة تكون جميع الاسنان القواطع قد ذابت نوع ذوبان وتتعرى الثنايا لا سيما ثنايا الحيوان الذي غذاؤه جيد وتأخذ هذه الاسنان في التخلخل وتؤول الى السقوط وتكون قرون الكبوش المارينوسية واضحة النمو وخشوناتها غليظة متباعدا بعضها عن بعض

ومن الشهر الخامس عشر الى الثامن عشر تبرز الثنايا البدلية وتتعرى الرباعية وتكون اصول تلك القرون مشتملة على جملة خشونات ودوائر صغيرة بعضها مختلط ببعض وعددها مختلف *

ومن سنتين الى سنتين ونصف تبدل الرباعية بغيرها وتصير علامة حقيقية دالة على هذه المدة وتكون الاسنان اللبنية باقية اذ ذاك متغيرة تغيرا شديدا كأنها جسم غريب ويشاهد في اصول قرون الكبوش المتقدمة خشونة ثالثة صغيرة جدا غير منتظمة متقاربة ومن ثلاث سنوات الى ثلاث ونصف تبدل الوسطى

بغيرها وقد تسقط النواجذ حينئذ وتكتسب الثنايا نوع طول مع نوع ذوبان

وقد يظهر فى اصول قرون الكبوش السابقة خشونة رابعة شبيهة بالخشونة التى قبلها

ومن اربع سنوات الى اربع ونصف تبدل النواجذ وتصير الثنايا والرباعية متغيرة وتذوب ذوبانا تاما وتكون الوسطى جديدة

ويحصل فى اصول القرون السابقة خشونة خامسة

ومن السنة الخامسة الى الخامسة ونصف يصير القوس السنى مستديرا وتأخذ النواجذ فى التغير

وفى السنة السادسة لم يعرف عمر الضأن من اسنانه وانما يعرف بالتخمين وبالتغيرات التى تعتريها وسبق الكلام عليها موضحا فيها يمكن معرفة هل الشاة بلغت هذه المدة او جاوزتها ومن المهم ان نذكر انه فى السنة السابعة تتعرى الثنايا او تتخلخل ثم الرباعية والوسطى ثم بقيه الاسنان ثم ان تجار الضأن قد يعرفون عمره فى الاسواق بمجرد رؤيه رؤس الشياه فاذا وجدوا طرف انف الشاة صغيرا مستطيلا قالوا ان هذه الشاة صغيرة بلغت من العمر سنتين ونصفا لكونهم لا يجدون هذا الوصف فى الشاة التى جاوزت هذا العمر وبلغت اربع سنوات ولان طرف رأس الشاة الصغيرة يكون منتفخا متجنا ذا هيئة مخصوصة بخلاف الشاة الكبيرة التى دخلت فى سن الكهولة فان شفتها السفلى تصير متدلية وسقط بعض اسنانها القواطع او كلها

الفصل الثالث فى عمر الكلاب

الغالب ان الكلاب لاتعيش الاعشر سنوات فاكثر الى ثنتى عشرة سنة ويختلف عمرها باختلاف اصنافها واختلاف الشروط الضرورية للحياة فالكلاب الاهلية لايظهر فيها الكبر بخلاف الكلاب الوحشية ويمكن معرفة عمر الكلاب من مايعرف به عمر الخيل من التنوعات التى تعترى اسنانها ويعرف من هيأتها الظاهرة المدد الرئيسة التى لحيا تها ولايعرف منها مقدار مامضى عليها من السنين

واعلم ان للكلب البالغ ثنتين واربعين سنا منها عشرون فى الفك الاعلى وثنتان وعشرون فى الفك الاسفل لانه مشتمل على ضرسين زآئدتين لاتوجدان فى الفك الاعلى قط وكل الاسنان ماعدا الانياب محتوية على عنق واضح جدا مستور باللثة وفاصل جدر السن عن جسمها وان لوحها السنى محتو على زوآئد حادة موضوعة وضعا خاصا ليتمكن الكلب بها من تمزيق الرمة وهرسها حين التغذى منها والغالب ان اسنان الحيوان الذى يغتذى من اللحوم لاتمو نموا مفرطا بل تمو نموا وسطا فلهذا كانت قليلة الذوبان بالنسبة لذوبان اسنان الحيوان غير المجتر * وقد يكثر ذوبان اسنان الكلاب التى تغتذى من الرمم اوفضلاتها فتصير حينئذ معرضة لذهاب جملة منها اما بانكسارها واما بسقوطها

ولما كانت الكلاب تحب اكل اللحم ونحت العظم حبا شديدا كانت اسنانها المقدمة واسنانها القواطع وانيابها تذوب ذوبانا غير منتظم فلهذا كانت مدة البحث فيها عن عمر تلك الكلاب قليلة ومتى بلغ الكلاب اربع سنوات تغير قوسه السنى تغيرا

شديدا واختل واشتبه الامر

بيان الاسنان القواطع والانياب

القواطع ثنتا عشرة فى كل فك ست منفرزة متقاربة وتزداد غلظا وطولا من الثنايا والرباعية والنواجذ وكلما بعدت عن الثنايا غلظت وارتفعت وتفوق نواجذ الفك الاعلى على رباعيته وتتباعد عنها وتنتهى بطرف مخروطى الشكل مائل الى الخلف من الجهة الوحشية فلهذا صارت النواجذ المذكورة كناب حقيقى تمر بقربه وتحتك معه انياب الفك الاسفل

ومتى كملت الاسنان البدلية ولم يذب منها شئ صارت جميلة المنظر بيضاء صافية وصار لوحها السنى محتويا على حافة مقدمة حادة وجزء منحدر كقوس اسنان الحيوان المجتر * وصارت حافاتها المقدمة متسننة اى مشتملة على ثلاثة فصوص اقواها واعلاها الفص الذى فى الوسط الذى هو طرف السن اما الفصان الجانبيان فمخروطيان صغيران موضوعان بجانبى الفص الرئيس وجزءهما المنقطع الباطن قليل الوضوح لاسيما اذا كانت الاسنان صغيرة مطابقة لجسم الحيوان وهذا الانقطاع يسمى عند العوام بالظهر الذى اذا ذاب انمحت السن ثم ان الجزء المنحدر كالجزء المنحدر الذى لاسنان البقر مشرف على تجويف الفم وشاغل للسطح الباطن من الاسنان ويرى كانه مصنوع بالآلة الناحتة واذا تؤمل جانبه بقرب السن شوهد انه محدود بحافة حادة مكونة للفصين الجانبيين وفاصلة احدهما عن الآخر

وجدور الاسنان القواطع مفرطحة الجوانب ومائلة الى الخلف

فان كانت هذه الاسنان صغيرة شوهد فى جدر كل سن منها تجويف كبير عميق محتو على الجوهر اللبى وكلما تقدم الحيوان فى العمر ضاق هذا التجويف بحيث لايشاهد منه الا ثقب صغير مستدير ممتد فى باطن السن ولا فرق بين الاسنان اللبنية والاسنان البدلية الا فى الغلظ فان الاسنان اللبنية صغيرة جدا بيضاء اشد حادية من تلك وتمكث بعد الولادة مدة يسيرة ثم تسقط قبل ظهور البدلية بايام

والانياب المسماة عند العوام بالكلاليب والمزقات والاسنان الزاوية (صفحة ٤ شكل ١٠ و ١١ والف والف) اربع لكل قوس اثنان وهى آلات يستفيد بها الحيوان استفادة عظيمة اذ بها يحفظ نفسه من المكاره ويمزق بها اللحوم وغيرها ولا شك ان انياب الفك الاعلى اغلظ واطول من انياب الفك الاسفل وانها تنمو انموا عظيما وتتغير تغيرا متنوعا كتغير انياب الفرس وجزءها المنطلق هو على الشكل منحن من الخلف الى الظاهر ومنتهيه بطرف دقيق وفى سطحها الباطن انخفاض غير مخالف للجزء المنحدر الذى للقواطع مخالفة شديدة ومحدود كهذا الجزء بحافة قليلة الوضوح * ثم ان الانياب العليا مغروزة بقرب الاضراس اكثر من القواطع وتتصالب مع الانياب السفلى حين مرورها من خلفها اما الانياب السفلى فمغروزة بقرب النواجذ التى فى الفك الاسفل وتتحاكك فى السطح المؤخر الذى للنواجذ التى هى الانياب الصغيرة التى فى الفك الاعلى ومتى انطبق احد الفكين على الآخر مرت الانياب السفلى من بين النابين الاعلوين الصغير والكبير وتصالبت معهما وتحاككت

فيهما لاسيما مع الانياب الصغيرة وهذا التصاب واضح جدا يفهم منه كيفية عض الكلاب وتمزيقها اللحم وكيفية نهشها الاجزاء حين انطباق انيابها عليها ويعرف ايضا ان الانياب هي الآلة الضرورية للعض لامحالة فان فقدت ضعف العض وصار غير متلف فلهذا كانت الرعاة تكسرها او تقلعها من الكلاب المحيطة بالقطيع كيلا تتلف شيأ منه بعضها * وقد شوهد مرارا عديدة ان انياب الكلاب الكهلة مائلة الى الخلف مانعة من تحرك الفك الاسفل فان كان هذا المنع مفرطا كفى لازالة كسر تلك الانياب فاذا كسرت عاد للفك تحركه

بيان بروز وانمساح الاسنان القواطع والانياب

اعلم ان الاسنان القواطع والانياب اللبنية مخالفة للاسنان البدلية نوع خلاف وانها تبرز قبل الولادة او بعدها بمدة يسيرة فان ولد الحيوان بدونها شوهد ان اسنانه القواطع وانيابه العليا تبرز كبروز الاسنان البدلية قبل بروز اسنان الفك الاسفل بمدة يسيرة وهذه الاسنان اللبنية المسماة عند العامة بالاسنان الصغيرة شديدة البياض دقيقة حادة سريعة النمو ثم تكتسب هيئة الزهر ثم تتعرى (شكل ٧ و ٨) والغالب ان تبدل بغيرها في الشهر الثاني او الثالث وليس ذلك مطردا في جميع الكلاب في زمن واحد وان بروز هذه الاسنان واضح سريع في الحيوان الكبير الحجم دون صغيره وان الحيوانات الكبيرة الحجم يتم بروز اسنانها البدلية من الشهر الرابع الى الشهر الخامس بخلاف كلاب الصيد فان اسنانها البدلية لا يتم بروزها الا في الشهر السابع او الثامن ولا شك ان الاسنان القواطع التي

للكلاب لا تبرز معترضة كبروز قواطع الحيوانات التي تغتذى من الحشيش بل تبرز فى الخارج بطرف حاد بدون تزاحم ولا تكتسب هيئة زهر النرجس الابعد ان تحصل على طول تام وهذا امر جلى لا يحتاج الى توضيح

والحيوانات التي تغتذى من اللحوم تبرز اسنانها القواطع البدلية قبل تمام نمو اجسامها بخلاف اسنان الحيوانات التي تغتذى من الحشيش فانها لا تبرز الا بعد تمام نمو جسمها والاسنان اللبنية التي للكلاب لا تمكث الا مدة يسيرة لان هذه الحيوانات محتاجة الى آلة قوية جدا تتمكن بها من عقر بعض الحيوانات التي تغتذى منها او من فضلاتها واول ما يظهر من الاسنان البدلية الثنايا ثم الرباعية ثم بعد خمسة اشهر تظهر النواجذ وقد تظهر الانياب معها او قبلها بايام يسيرة وتستمر هذه الاسنان بيضاء جميلة سليمة مدة عشرين شهرا فاكثر الى سنتين ثم تذوب الثنايا ذوبانا ما وينقص بياضها ثم ان ثنايا الفك الاسفل تتغير اولا من تحاكك بعضها ببعض ثم الرباعية ثم ثنايا الفك الاعلى وهكذا اما الانياب فلا تتغير فى الغالب الا بعد تلف الاسنان القواطع نوع تلف

وقد ذكرنا ان انمساح الاسنان القواطع ليس الا زوال زهر النرجس بمعنى ان الفص الاوسط يزول وينخفض ويصير مساميا للفصين الجانبيين وقد يتقدم الانمساح وقد يتأخر بحسب طبيعة الغذاء الذى يتناوله الحيوان فالكلاب التي تغتذى دائما من اللحوم تذوب اسنانها اكثر من ذوبان اسنان الحيوان الذى يغتذى من الخبز والشوربة وان ذوبان الاسنان القواطع يتبع

سير بروزها الذى هو جيد سريع فى الحيوان الكبير الجثم دون
صغيره واعلم ان الحيوان حين تحتّه العظام او نهشه فضلات الرمم
قد تكسر جملة من اسنانه او تقلع وقد تذوب اسنانه القواطع
ذوبانا مختلا واول ما يذوب منها حافاتها المقدمة ثم اسطحتها
الظاهرة فهذه الاختلافات القبيحة متواترة جدا موجبة
لعسر معرفة عمر الحيوان من اسنانه بل قد يتعذر بها معرفته
فلا يستغرب ما ذكر فى بعض الكتب من ان الكلاب اذا بلغت
ثلاث سنوات لا يعرف عمرها من اسنانها القواطع والتحقيق
الذى ينبغى اعتماده ان الكلاب الكبيرة الجثم التى تغتذى من
اللحوم بالخصوص يظهر من اسنانها ان عمرها اكثر مما هى
عليه فى الواقع فالغالب ان الكلاب الكبيرة الجثم التى بلغت من
العمر سنتين تكون ثناياها ورباعيتها قد امسحت مع ان العادة
ان يحصل امساحها بعد سنتين ونصف فاكثر الى ثلاث فيكون
الحيوان متقدما فى العمر بستة اشهر او عشرة فان اردت
تحديده فانظر الى الانياب لانها باقية بدون امساح * وقد
ذكرنا جميع التغيرات الناشئة عن الدوبان العارض او غيره
من الاسباب العارضة وعرفنا ان الاسنان تكون فى الغالب
مشتملة على علامات واضحة يتمكن بها الشخص من معرفة
العمر المجاوز ثلاث سنوات وسأذكر ان العلامات الدالة
على اكثر من ثلاث سنوات اقل وضوحا من العلامات المتقدمة
فعلامات الثلاث سنوات مثلا اوضح من العلامات التى تظهر
بعدها اى التى تدل على اربع سنوات وهكذا فيعلم من ذلك ان
عسر معرفة العمر يزداد شيأ فشيأ حتى لا يمكن معرفته

بالكلية

والغالب ان ثنايا الفك الاعلى لا تمسح الا بعد امساح ثنايا ورباعية الفك الاسفل وذلك بعد زوال الزهر النرجسي وهذا لا يحصل الا بعد بلوغ الحيوان ثلاث سنوات فعلى مقتضى العادة لا تمسح ثنايا الفك الاسفل الا بعد خمسة عشر شهرا فاكثر الى اثنين وعشرين شهرا (شكل ١٠) وهذا في الحيوان الصغير الحجم اما كبيره فتمسح ثناياه السفلى في الشهر الخامس عشر فما بعده الى السابع عشر

ومن سنتين ونصف الى ثلاث تنخفض رباعية الفك الاسفل وتصير حافاتها الحادة متساوية (شكل ١١) وقد يفقد الزهر النرجسي من ثنايا الفك الاعلى في السنة الثالثة فما بعدها الى السنة الرابعة وهذا اوضح في الحيوانات الكبيرة الحجم منه في الحيوانات الصغيرة الحجم وامساح نواجذ الفك الاسفل بعقب امساح تلك وذلك حين بلوغ الحيوان اربع سنوات (شكل ١٢) فان حصل الامساح بانتظام فقد تمسح الرباعية العليا من السنة الرابعة الى الخامسة وهذا كله بحسب قوة الحيوان وتصير الثنايا السفلى في هذه المدة سوداء وسخة تالفة نوع تالف بمعنى ان بعضها منكسر او مفقود ثم بعد بلوغ الكلب خمس سنوات عسرت معرفة عمره معرفة يقينية وانما يعرف بالتخمين فقط *

وقد شوهدت حملة من الكلاب اخذت نواجذها اى انيابها الصغيرة في الامساح بعد ست سنوات لكن لم تتيقنه حتى تجعله علامة على بلوغ الحيوان هذه المدة لكونه تارة يتقدم عليها وتارة يتأخر عنها وهو الغالب

بيان الاضراس

هي اثنتا عشرة في كل فك ست يمنى وست يسرى وقد يوجد في الفك الاسفل ضرسان زائدتان متفرزتان بين الانياب والضرس الاولى وهذه الاضراس زهرية ترجسية كالاسنان القواطع ولا تمكث الامدة يسيرة ويكون سقوطها ناشئا دائما عن صدمة ظاهرة ثم ان الاضراس المقدمة العليا والسفلى متباعد بعضها عن بعض وتزداد غلظا من الضرس الاولى الى الاخيرة بمعنى ان الضرس الاولى اصغرها والضرس الاخيرة اغلظها وان لوحها السنى غير منتظم يشاهد في وسطه طرف طويل هرمى الشكل موضوع جيد الكسر وتمزيق الاجسام الداخلة في الفم فالضرس الاولى التي جدرها ذو سطح واحد قد تتعدم في بعض الاحيان وان وجدت كانت منكسرة بفعل عرضى اما الضرسان اللتان امام الاضراس فقد تعتريهما التغييرات التي تعترى تلك وهذه الاحوال نادرة واما الاضراس الثلاث الاخيرة من كل فك فهي مسئرة مختلفة النظام فالضرس الاولى منها التي في الفك الاعلى غليظة جدرها ذو فروع ثلاثة وجسمها مستطيل من الامام الى الخلف ولوحها السنى محدب محتو على طرفين بارزين رئيسين والضرس الثانية منها غليظة مستطيلة الجانبين جدرها ذو فروع ثلاثة كالاولى وهي مرتفعة نحو القبة الحلقية والضرس الثالثة اقصر من سابقتها لوحها السنى كاوحيهما وجدرها ذو فرعين فقط والضرس الاولى من اضراس الفك الاسفل اكبر حجما من الضرسين السابقتين وشبيه بالضرس المقابلة له من اضراس الفك الاعلى

ويتحرك على الضرسين الاوليين من هذه الاضراس والضرس
الثانية من الاضراس السفلى شبيهة بالضرس الاخيرة من
الاضراس العليا * والضرس الثالثة من هذه الاضراس السفلى
قصيرة جدا مختصة بالحك حين المضغ واللوح السنى الذى لهذه
الاضراس الثلاث الاخيرة مفرطح موضوع جيد الكسر
وهرس الاجسام التى تكون تحته اما اللوح السنى
الذى للاضراس الثلاث الاول فمحتو على جملة ارتفاعات تنفذ
فى الجواهر التى تحتها فتمزقها * والاضراس الثلاث اللبنية
الاول لاتخالف الاضراس البدلية المتقدمة الا فى البياض
والقصر وتسقط وتبدل بغيرها فى مدة ثم الانياب ونمو
الاضراس البدلية المسشرة لايعرف به مقدار العمر لعسر فتح
افواه الكلاب بسبب عضها القبيح فلهذا تركوا البحث عن
هذه الاضراس وجعلوها فى زوايا الاهمال فلم يعرفوا التغيرات
التى تعتريها من تحاككها وعلى كل حال ينبغى ان نذكر كيفية
بروزها لاسيما اضراس الكلاب الكبيرة الجثم فالاضراس
الاول اللبنية تبرز قبل الولادة بمدة يسيرة اوبعدها كذلك وتبرز
الضرس الاخيرة من هذه الاضراس بعد شهر ونصف من الولادة
اما الضرسان الاوليان فتبرزان بعد شهرين واما الضرس الثانية
والثالثة من الاضراس البدلية فتبرزان بعد سقوط الاضراس
اللبنية بثلاثة اشهر واما الضرس الاولى البدلية فتبرز فى الشهر
الثالث اوالرابع ويتم بروز الضرس الثالثة من هذه الاضراس
فى الشهر الخامس اوالسادس * وقد ذكرنا آنفا ان هذه التغيرات
اقل وضوحا فى الحيوان الصغير الجثم منها فى الحيوان الكبير الجثم

بمعنى ان اضراس الحيوان الصغير الحجم يتأخر بروزها الى الشهر الثامن او التاسع

كلام مجمل فى عمر الكلاب

اعلم ان الكلاب تولد منطبقة الاعين ولا تنفتح الا بعد عشرة ايام فاكثر الى خمسة عشر من الولادة والغالب انها تولد مستكملة الاسنان اللبنية فان ولدت بدونها برزت عقب الولادة ثم اذا بلغ الكلب من العمر شهرين فاكثر الى اربعة سقطت ثناياه العليا والسفلى وبقى محلها خاليا عن الاسنان البدلية التى مختفية تحت اللثة ثم تبرز كلها فى الشهر الخامس فما بعده الى الشهر الثامن وهذا كله باعتبار اصناف الكلاب فاذا صار الكلب بهذه المثابة قيل له مستكمل الاسنان ثم بعد بلوغه سنة يكون فمه سليما نظيفا بمعنى ان اسنانه القواطع وانيابه تكون بيضاء نقية سليمة ويكون غشاء الفم وردى اللون وطرف انفه مستطيلا

وفى الشهر الخامس عشر تأخذ الثنايا السفلى فى الانمساح مع سلامة الفم وبياض الانياب والقواطع

ومن سنة ونصف الى سنتين يتم انمساح الثنايا السفلى (شكل ١٠) وتأخذ الرباعية السفلى فى الانمساح

ومن سنتين ونصف الى ثلاث قد يزول الزهر النرجسى عن الرباعية المذكورة (شكل ١١) وتأخذ الثنايا العليا فى الانمساح ويتغير الفم وتتغير القواطع والانياب تغيرا واضحا ويبتدئ فيها التكدر وتفقد منها اوصافها التى كانت عليها فى سنة ونصف من الولادة

ومن سنة ونصف الى اربع تنمسح الثنايا العليا وتصير الاسنان
متكدرة وقد تصير الانياب صفراء
ومن السنة الرابعة الى الخامسة تنمسح الرباعية العليا وتصير
الاسنان الصغيرة والثنايا والرباعية كدرة متغيرة نوع تغير لاسيما
اسنان الكلاب الكبيرة الحجم التي تغتذى من اللحوم او تنحت
العظام ثم بعد بلوغ الكلب خمس سنوات اختلت معرفة عمره
من اسنانه بل لا يعرف منها بالكلية وانما قد يعرف معرفة خفية
من البحث عن حال انيابه الاربع ونواجذه العليا وغاية ما يعرف
منها بلوغه خمس سنوات او مجاوزته اياها
والعادة ان الكلب اذا شرع في السنة السادسة اصفرت انيابه
ونواجذه العليا وانقصفت وامسحت جميع اجزائها المتحاكة
وتظهر الصفرة في اسنان بعض الكلاب حين بلوغها
اربع سنوات وهذه الصفرة قاصرة على اصول ثلث الاسنان
ولا تعم جميعها الا بعد السنة الخامسة ولا تتضح الا بعد مضى
السنة السادسة فحينئذ تنقصف الانياب الصغيرة العليا وتصير
الاسنان القواطع الصغيرة كدرة سوداء وسخة بل قد تتفقد
ثم بعد هذه السنة باشهر تنقصف الانياب الكبيرة وتذوب من محل
احتكاكها وتنخفض بسرعة هذا وقد شوهد ان انياب بعض
كلاب بلغت من العمر ثماني سنوات او تسعا ذابت ذوبانا تاما
ولم يبق منها بدون ذوبان الا اجزاء يسيرة قريبة من اللثة
ثم ان التغيرات المتقدمة تزداد شيأ فشيأ وتتراكم مع اختلال
فلهذا لا يصح الاعتماد عليها في معرفة العمر واذا امعن النظر
في الشكل الثالث عشر من الصفحة الرابعة امكن تصور

تلك التغيرات فى الذهن باعتبار الكلاب الكبيرة المتقدمة
فى العمر

وقد يضاف الى هذه الاعتبارات المختصة بالاسنان اشياء اخر
وهى ان الكلاب المتقدمة فى العمر قد يشيب شعرها الذى
حوالى انوفها واعينها والشعر الذى على جباهها وان بوزها
يقصر بعد ان كان طويلا فى حال صغرها وتغلظ رؤسها لاسيما
اطرافها وتكتسب هيئة تدل على الكبر والغالب ان الكلب متى
بلغ من العمر ثمانى سنوات صار طرف عرقوبه منتصلا خاليا عن
الشعر مستورا بقشف قشرى متراكم وتصير اطراف اصابع
الكلاب الكبيرة غليظة مستديرة واظافيرها مستطيلة على
هيئة نصف دائرة بعد ان كانت مجوفة مقرطعة ويصير ظهرها
خاليا عن الشعر مخمولا مشتملا على قشور اوسما بانوع جرب
وهو مرض قبيح فى الكلاب لا يقبل البرء ويزداد كل يوم شيا
فشيأ حتى يهلكها

الفصل الرابع فى عمر الخنزير

الواقع ان معرفة عمر الخنزير المأخوذة من اسنانه غير مهمة لاسيما
عند تجار الخنازير فانهم لا يلتفتون الى اعمارها اذ لا يمكن
معرفتها من اسنانها الا اذا اضجعت وثبتت رؤسها وادخل
فى افواهها عصى صغيرة لتفتحها ومع ذلك لم نترك التكلم على
اعمارها بل نقول ان الخنزير حيوان اهلى منتشر فى الاقاليم
يتجر فيه ناس كثيرون فلهذا صارت معرفة عمره مهمة والتفصل
الخصومات الناشئة عن الاختلاف فيه بين ايدى ارباب الطب
الحكمى ولا يذبح جميع الخنازير قبل بلوغها ثلاث سنوات بل

بعضها يجاوز هذا السن سواء كان هذا البعض ذكرا ام انثى ليستنتج * فعرفة عمره ضرورية وايضا يحتاج اليها من حيث العلم فالتزمنا ان نجعل له فصلا مخصوصا من هذه الرسالة لكونها مشتملة على اعمار الحيوانات الاهلية ثم ان الحكيم ايريك ويورج رئيس مدرسة الطب البيطرى التى فى كوبنهاج ذكر فى نبذة لطيفة ارسلها الى ارباب مجلس الزراعة الملكى فصلا مخصوصا فى عمر الخنزير فلما رأه ارباب ذلك المجلس مدحه لكونه مشتملا على اشياء صحيحة متعلقة بما نحن بصدده

ومتى تم بروز اسنان الخنزير صار كل فك من فكيه محتويا على ست اسنان قواطع وناب واربعة عشر ضرسا موضوعة بانتظام فى جانبى الفم الايمن والايسر ستة منها بنية قابلة للابدال وشبيهة باسنان الكلب

بيان الاسنان القواطع والانياب

قواطع الفك الاعلى مخالفة لقواطع الفك الاسفل فى الهيئة والطول ولها وظيفة مخصوصة وثنايا ورباعية الفك الاعلى متحدة التركيب ومتغرز بعضها بجانب بعض اما النواجذ فهى متباعدة عن الرباعية ومخالفة لها وترى كانها زائدة منفصلة غير نافعة للحيوان ثم ان الاسنان الاربع الاول قصيرة مخينة مائلة الى الخلف نحو تجويف الفم ولا يخالف بعضها بعضا الا فى كون الثنايا اقوى من الرباعية وسطحها الظاهر يكون فى اوائلها اسود مخططا خشنا يأخذ فى البياض والملاسة شيأ فشيأ ولوحها السنى موضوع على سطح منحرف يشاهد فيه كاللوح السنى الذى للفرس قرطاس او تجويف قعره اسود

وحافتاه غير مشتملتين فالظاهرة منهما ارفع من الباطنة ومشعلة على شرم * واللوبان الذى يعتريهما بالتدريج يحفضهما ويتلف تجويفهما ويوجب انمساحهما وجدر الاسنان القواطع المذكورة هرمى محتو باطنه على تجويف يتغير تغيرا كالتغير الذى يعترى مثله من الحيوان آحادى الاصابع

والنواجذ العليا خارجة عن صف الاسنان موضوعة فى المسافة التى بين الرباعية والانياب وهيئتها حينئذ كهيئة سن قصيرة مستقيمة ذات زهر نرجسى * وهذه النواجذ جدرها بسيط اطول من جسمها وتشبه الضرس الزائدة التى للفك الاسفل ولما كانت هذه الاسنان الاخيرة غير معروفة الوظائف كانت معرضة لجملة عوارض كالقلع والكسر وبندرمكثها مدة طويلة * والاسنان القواطع اللبنية التى للفك الاعلى مخالفة للاسنان البدلية التى لهذا الفك وقد مر الكلام عليها الان اللبنية اقصر من تلك ومستديرة نوع استدارة وموضوعة وضعا مغايرا لوضعها بحيث تمنع مرور الناب الاعلى من جنبها وهذا المنع يمنع الحيوان من الاكل وقد يوجب هزاله فى بعض الاحيان فالاصوب حينئذ قلع القواطع المذكورة فان قلعها سهل ليس فيه خطر

والاسنان الست القواطع السفلى منغرز بعضها بجانب بعض ومتجهة من الامام الى الاعلى اما الثنايا والرباعية فتلامسة واما النواجذ فغير ملامسة للرباعية بل متباعدة عنها نوع تباعد وان الثنايا اطول من الرباعية وهذه الاسنان مخالفة لاسنان الفك الاعلى فهى مستطيلة غليظة مستقيمة نوع استقامة وباجتماعها

صارت هيئتها كهيئة دقيق مستطيل الى الامام ومختص برفع الاجسام وعقرها بكيفيات مختلفة ومتى بلغ الحيوان سنتين فاكثر الى ثلاث اسودت تلك الاسنان وانعدمت ملاسة ظاهرها لكن قد تبيض فيما بعد وتصير ملساء وليس لها فى الواقع لوح سنى لان اطرافها غير منتظمة الاستدارة ومع ذلك كله قد يكون لها حافة مقدمة قليلة الوضوح وجزء منحدر غير محدود بحافة بخلاف مثله من الثور والكلب وانما هو محتوعلى تلمين مستطيلين واضحين جدا

وتركيب النواجذ السفلى كتركيب الثنايا والرباعية الا انها اقصر واقل غلظا منها وهى كالنواجذ العليا فى انها ذات منفصلة موضوعة خلف الرباعية وامام الانياب

والانياب المسماة عند العوام بالكلاليب والمعزقات ونحوها اسنان كبيرة طويلة منحنية من الباطن والظاهر وموضوعة كانياب الكلب بين النواجذ والضرس الاول من كل قوس * وهذه الانياب ينتفع بها الحيوان فيعقر بها غيره ويحفظ بها نفسه وتغرمدة حياته والانياب العليا مخالفة للانياب السفلى فالانياب العليا التى للخنزير البالغ اغلظ واقصر من انيابه السفلى واذا قلعت من اسنخها علم ان كل واحدة منها غليظة هرمية الشكل اصلها جدرها وهى منحنية من جميع امتدادها من الظاهر الى الباطن وتحاكك مع السطح المقدم الذى للانياب السفلى وكلما غلظت واستطالت انحنت الى الخارج ورفعت الشفة ثم جاوزتها وبرزت فى خارج الفم * واطرافها فى الحيوان الحديث محتوية على حلقة سوداء تزول فى اوقات مختلفة وسطحها

الباطن مشتمل على اتلام مستطيلة قليلة العمق حافاتها تجعل هذا السطح غير منتظم والنابان اللذان فى الفك الاسفل قد يطولان مع تقدم العمر طولا شديدا لاسيما فى الذكور الفحول ويتصالبان مع الانياب العليا حين مرورهما من امامها وكلما طالا انحنيا من الخلف الى الباطن ولما كان نموها مستمرا انحنت على هيئة حلزون واضاقت حركة الفك *وهذا النمو المختل القبيح المشوه للخنازير الوحشية قد يحصل فى اناث الخنازير الاهلية ويلجئ الى ازالة تلك الانياب المتصالبة الداخل بعضها فى بعض فتزال اما بردها واما بكسرها باى طريقة وجدت

اما الانياب اللبنية فهى فى الواقع اقصر وارق من الانياب البدلية ويعرف ذلك حين التطابق بينها بعد بلوغ الحيوان ثلاث سنوات

بيان كيفية بروز وانمساح القواطع والانياب

الخنزير الحديث العهد بالولادة يكون فى الغالب مشتملا على النواجذ والانياب العليا والسفلى ثم اذا بلغ ثلاثة اشهر فاكثر الى اربعة تكاملت اسنانه اللبنية ومتى بلغ ستة اشهر سقطت نواجذه السفلى وخلفها النواجذ البدلية بعد مدة يسيرة وانمسحت فى هذه المدة اطراف الثنايا والرباعية ومتى بلغ عشرة اشهر برزت نواجذه العليا بعد سقوط نواجذه اللبنية واذا بلغ احد عشر شهرا سقطت انيابه اللبنية وخلفها الانياب البدلية واكتسبت طولا شديدا وحين بلوغه عشرين شهرا فاكثر الى سنتين تسقط ثناياه العليا والسفلى ويخلفها غيرها *ومن سنتين ونصف الى ثلاث تسقط رباعيته العليا والسفلى ويصير مشتملا على جميع

اسنانه البدلية ثم ان جميع الاسنان القواطع والانياب السفلى قد تتقصف وتتمسح اطرافها المنطاقة وينقدم جزء من جوهر الانياب المذكورة بسبب تحاككها مع الانياب العليا وان ذوبان الثنايا والرباعية التى للفك الاعلى يوجب زوال تجويفها ثم تمسح فهذه التغيرات التى يتمها السقوط او كسر بعض الاسنان لاسيما النواجذ لما يستدل بها على مقدار العمر لكن بالبحث الدقيق عنها فى جملة من الحيوانات قد يستنتج منها علامات اكيدة يعرف بها العمر وهذا البحث تركناه لاسلافنا فان الهمم قد قصرت من تكدر الاذهان وصروف الازمان

بيان الاضراس

هى سبعة فى كل فك قد تزداد غلظا بالتدريج من الضرس الاول الى الاخير الذى هو اغلظها وجسمه فى الحقيقة مثلث التربيع والضرس الاول منها هو الزائد لا يقبل البدل ولا يمكث الامدة ثم ان الضرس الاول الزائد الذى فى الفك الاسفل اقل غلظا من مقابله الذى فى الفك الاعلى وشبيه بالنواجذ ومحتو على زهر نرجسى ومنفصل عن الانياب بالضرس الاول الحقيقى اما الضرس المذكور الذى فى الفك الاعلى فلتصق بالضرس الذى بجانبه ويرى كانه مشترك مع بقية الاضراس فى وظيفة المضغ والاضراس الثلاث السفلى مخفضة الجوانب ولوحها السنى محتو على صفيحة مستطيلة من الامام الى الخلف وعلى جملة ارتفاعات غير منتظمة

والاضراس الاخيرة اغلظ من الاضراس الامامية ولوحها السنى مفرطح ذو ارتفاعات غير منتظمة * والستة الاضراس

العليا اغلظ من السفلى ومتحدة التركيب * ولوحها السني مشابه للوح السني الذي للثلاثة الاضراس الاخيرة السفلى * ثم ان الانتظام المذكور جعل اضراس الخنزير معدة لتمزيق وهرس ومضغ الجواهر التي في الفم والخنزير يولد مشتملا على اربع اضراس مقدمة في كل فك ثنتان يمنيان وثنتان يسرايان ومتى بلغ ثلاثة اشهر تكاملت اضراسه اللبنية وعلى رأي المعلم ويبوران بروز الاضراس الزائدة يحصل من الشهر الخامس الى السادس وكذلك بروز الضرس الاخير ويبزغ الضرس الثاني بعد عشرة اشهر ويبزغ الضرس الثالث وهو الاخير بعد ثلاث سنوات ويبدل الضرس الثاني اللبني بضرس آخر بعد بلوغ الحيوان خمسة عشر شهرا فاكثر الى ثمانية عشر شهرا ويمكث الضرس الاول اللبني اكثر من هذه المدة ولا يسقط الا بعد مضي سنتين

كلام مجمل في عمر الخنزير

لا يعرف من اسنان الخنزير اكثر من ثلاث سنوات ولم يزد احد عليها الى الآن لان الخنزير متى بلغ هذا السن وبزغت اسنانه الرباعية البدلية اختل نظام فكيه وقد ذكرنا ان الخنزير متى بلغ ثلاثة اشهر او اربعة صار مشتملا على جميع اسنانه القواطع اللبنية وانيابه وبواسطة ابدالها التدريجي يعرف عمره فانه مؤسس على ذلك الابدال * ومن ستة اشهر فاكثر الى عشرة اشهر تسقط النواجذ ويخلفها غيرها الا ان بروز النواجذ العليا يسبق بروز النواجذ السفلى بشهرين او ثلاثة وحينئذ تبدل الانياب اللبنية بغيرها * ومن عشرين شهرا الى سنتين تبدل ثنايا الفكين اللبنية بغيرها وتكون دائرة سوداء في اصل

الانياب * ومن سنتين ونصف الى ثلاث تبرز الرباعية البدلية
في الفكين وتصير الثنايا سوداء خشنة قليلة الذوبان
والواقع ان جميع ماذكر غير حاضر لعمر الخنزير لانه يزيد بجميعها بعد
ذلك ولما كانت معرفة هذا العمر غير مهمة جدا لاسيما عند
التجار لكون الخنزير غير معد للاعمال وكونه يذبح بعد بلوغه سنتين
اقتصرنا الكلام عليه ولم يلتفت احد الى عمره في حال صغره
وانما يلتفت الى سمنه ونمو جسمه اما الخنازير التي تبقى بعد بلوغها
ثلاث سنوات لاستنتاجها فيمكن معرفة اعمارها من انيابها
فانياب فحولها ترفع شفاهها العليا وتزداد طولا الى ان تبلغ هذه
الفحول خمس سنوات ثم تخرج الانياب السفلى من الفم في السنة
السادسة وتصير لولبية وتحصل في هذه المدة غضون حول
الاعين وتبرز الارتفاعات الجانبية التي للخيشوم الناشئة عن
جدور الانياب العليا ثم بعد مضي سبع سنوات من الولادة
قد يشيب الشعر الذي حوالي الاعين وتتضح الاقواس الحاجبية
وتغور الاعين في قعور التجاويف الحاجبية ويزداد الوجه قبحا
وتشوها مع استطالة تلك الانياب وغلظ الخرطوم فيصير رأس
الخنزير حينئذ شنيع المنظر مهولا وهذا كله يدل على التقدم
في العمر

تذييل في بيان الواح الفكولة واشكالها

بيان اللوح الاول

هو مشتمل على عشرة فكولة سفلى من الخيل يعرف منها عمرها
من حين الولادة الى ثماني سنوات اما الاسنان الست التي بجانبها
فيعرف بها الهيئة الظاهرة التي للاسنان القواطع وتركيب

بواطنها

الشكل الاول فك مهر حديث عهد بالولادة ثناياه ثم نموها مع نوع اعتراض

الشكل الثانى فك حيوان بلغ من العمر ستة اشهر اوسبعة وثناياه انمسحت نوع انمساح والحافات الباطنة التى لرباعيته سامتت حافاتها الظاهرة

الشكل الثالث فك مهر بلغ من العمر سنة ونواجذه برزت بعد شهرين اوثلاثة من ولادته وسامتت رباعيته ولم يذب منها شئ

الشكل الرابع فك مهر بلغ من العمر سنتين وثناياه ورباعيته انمسحت انمساحا تاما والحافة الباطنة التى لنواجذه سامتت الحافة الظاهرة منها

الشكل الخامس فك مهر بلغ من العمر ثلاثين شهرا فاكثر الى ثلاث سنوات وثناياه البدلية ظهرت من مدة قريبة وتلفت حافاتها الظاهرة نوع تلف وظهر قعر القرطاس السنى الذى للرباعية اللبنية لكثرة ذوبانها

الشكل السادس فك حيوان مضى عليه من العمر اربع سنوات ونصف ورباعيته البدلية ظهرت من مدة قريبة ولم تتغير ادنى تغير ولم تسامت الثنايا والحافة الباطنة من هذه الثنايا لم تتغير وهى اقصر من الحافة الظاهرة وذابت النواجذ اللبنية ذوبانا شديدا ولم يشاهد فيها الا طرف قعر القرطاس

الشكل السابع فك حيوان بلغ خمس سنوات ونواجذه جديدة سليمة من التغير وثناياه اخذت فى الانمساح والحافة الظاهرة التى

لرباعيته ذابت نوع ذوبان والحافة الباطنة المشرومة سلمية واقصر من سابقتها

الشكل الثامن فك حيوان بلغ من العمر ست سنوات وانمسحت ثناياه وقرب انمساح رباعيته ولم تزل الحافة الباطنة التي لنواجذه سلمية قليلة الانشرام

الشكل التاسع فك حيوان تدل ثناياه على انه بلغ من العمر سبع سنوات وتم انمساح ثناياه ورباعيته وسامت الحافة الباطنة التي لنواجذه الحافة الظاهرة منها من شدة الاحتكاك

الشكل العاشر فك حيوان بلغ من العمر ثماني سنوات لان جميع اسنانه قد انمسحت واخذت ثناياه في التصور بشكل بيضي وصار قرطاسها السني قريبا من حافتها المؤخرة

الشكل الحادي عشر سن مهر تشاهد من سطحها المؤخر — الف — فالالف دالة على جفوة تجويف اللوح السني — ب — والباء تدل على التجويف الباطن اي الجدر

الشكل الثاني عشر مهر ترى من سطحها المقدم ويعرف بها جسمها — الف — فالالف دالة على عنق السن — ب — والباء دالة على الجسم — ث — والثاء دالة على الجدر

الشكل الثالث عشر سن مهر صغير جدا يرى من شكلها بعد نشر جوهرها الطلائي عرضا جوهرها الطلائي الباطن اي المركزي

الشكل الرابع عشر سن حيوان بالغ مشقوقة نصفين طولا ليظهر منها تجويفها الظاهر — الف — وتجويفها الباطن يعرف من — ب — و — ث —

الشكل الخامس عشر سن حيوان بالغ منشورة الوسط نشرا ناقصا فى وسط السطح المقدم منها ليرى الجزء الاسفل الذى لقرطاسها السنى الذى يدل عليه — الف —

الشكل السادس عشر سن حيوان بالغ ايضا منشورة كنشر سن الشكل الرابع عشر — ا — فالالف دالة على التجويف الظاهر — ب — والباء تدل على الطرف الاسفل الذى للقرطاس السنى

بيان اللوح الثانى واشكاله

هو مشتمل على تسعة اشكال يعرف بها عمر الفرس من حين بلوغه ثمانى سنوات الى آخر اجله اما الشكل العاشر الذى بجانب هذه الاشكال فيعرف منه هيئة الاسنان بعد ذوبان لوحها السنى

فالشكل الاول عبارة عن فك فرس بلغ من العمر ثمانى سنوات وامسحت جميع اسنانه القواطع واخذ النجم الجديرى الذى للثنايا فى الظهور وصار هيئته كهيئة شريط صغير معترض موضوع امام القرطاس السنى بقرب الحافة المقدمة من تلك الاسنان

والشكل الثانى فك فرس تم له تسع سنوات واستدارت ثناياه واخذت رباعيته فى الاستدارة ولم تزل بقية قعر القرطاس السنى الذى للثنايا والرباعية قريبة من الحافة المؤخرة التى لهذه الاسنان الاربع التى هى حاملة للنجم الجديرى الذى هو فى الثنايا اوضح منه فى الرباعية

والشكل الثالث فك حيوان تم له عشر سنوات ولم يشاهد

فى ثنایاه ورباعیته الابقیة القرطاس السنی وقربت بقیة الجوهر الطلائی المرکزی من الحافة المؤخرة التی للوح السنی واستدارت الثنایا والرباعیة اما النواجذ فهی بیضیة الشکل

والشکل الرابع یعرف من هیئة اسنانه ان الفرس مضی علیه من العمر احدی عشرة سنة واستدارت جمیع اسنانه القواطع ولیست مشتملة الاعلی اثر دقیق جدا من الجوهر الطلائی المرکزی ملامس للحافة المؤخرة التی للوح السنی وظهر فی جمیع هذه الاسنان النجم الجدیری وصارت فضلة القرطاس السنی التی فی الثنایا اصغر من فضلته التی فی الرباعیة والنواجذ

والشکل الخامس یعرف منه ان الحیوان بلغ من العمر ثنتی عشرة سنة ولم تکن ثنایاه مشتملة علی الجوهر الطلائی المرکزی واستدار نجمها الجدیری

والشکل السادس یدل علی بلوغ الحیوان من العمر ثلاث عشرة سنة وصارت ثنایاه مثلثة واخذت رباعیته فی التثلث ولم تزل نواجذه مستدیرة ویستدیر النجم الجدیری الذی للرباعیة والنواجذ ویکون شاغلا لوسط اللوح السنی وتذوب الانیاب ذوبانا شدیدا وهنالک علامة اخری تدل علی هذا العمر وهی زوال الجوهر الطلائی المرکزی من نواجذ الفلک الاعلی

والشکل السابع یدل علی بلوغ الفرس اربع عشرة سنة وصارت ثنایاه ورباعیته مثلثة وازداد ذوبان الانیاب ازدیادا اکثر من ازدیاد ذوبان انیاب الفلک المتقدم

والشکل الثامن یدل علی ان الفرس تم له خمس عشرة سنة وقد

بلغت

بلغت ثناياه غاية التثلث وصار النجم الجديرى نقطة مستديرة فوق جميع اللوح السنى

والشكل التاسع يدل على بلوغ الحيوان ست عشرة سنة وقد صار جميع اسنانه القواطع مثلثة واخذت الثنايا فى التفرطح من احد جوانبها الى الآخر وبلغت الانياب اقصى الذوبان

والشكل العاشر مشتمل على خمس خرطات معترضة من سن حيوان بالغ فالخرطات الثلاث الاول منها — الف — ب — ث — مشتملة على القرطاس السنى والخرطتان الاخيرتان — دال — ر — مشتملتان على النجم الجديرى

بيان اللوح الثالث واشكاله

هو مشتمل على اثنى عشر شكلا مختصة بعمر البقر فالثلاثة الاول منها يعرف بها هيئة الاسنان القواطع الخارجة عن اسنختها والاشكال التسعة الباقية يعرف بها مقدار ما مضى على الحيوان من السنين

الشكل الاول سن عجل لبنية يرى من سطحها المقدم جدرها وجسمها فالجسم — الف — والجدر — ب —

والشكل الثانى عبارة عن سن بدلية تامة من حيوان بالغ ترى من سطحها المقدم — فالالف دالة على جسم هذه السن — والباء دالة على جدرها

والشكل الثالث سن ثور تامة سليمة تشاهد من سطحها المؤخر وهى مشتملة على جزء مخدر وتلمين وجدر — فالالفان تدلان على التلمين — والباء تدل على الجدر

والشكل الرابع فك عجل اسنانه القواطع مستديرة غير محكوكة

والاربع الاسنان القواطع الجانبية اعنى اليمنى واليسرى منحنية الى الجهة الوحشية بحيث ان القوس السنى منقسم قسمين متشابهين متباعد احدهما عن الآخر

والشكل الخامس فلك عجل مجلوب من مربى اسنانه القواطع اللبنية ذائبة ونجمها السنى واضح وهى متباعدة عن بعضها وعمر هذا العجل سنة كاملة

والشكل السادس فلك حيوان سقطت ثناياه اللبنية وخلفها ثنايا بدلية وله من العمر سنتان وصارت اسنانه الست اللبنية الباقية فضلات آيلة الى السقوط

والشكل السابع فلك حيوان ابدلت اربع من ثناياه اللبنية باربع ثنايا اخر ومضى عليه من العمر ثلاث سنوات وصارت اسنانه الاربع اللبنية الباقية اكثر تلفا من تلك وآيلة الى السقوط

والشكل الثامن فلك حيوان جاوز اربع سنوات وله ست اسنان بدلية وثنتان لبنيتان

والشكل التاسع فلك حيوان بلغ من العمر خمس سنوات وسقطت جميع اسنانه اللبنية وخلفها غيرها وصارت اسنانه البدلية آيلة الى الاستدارة

والشكل العاشر فلك حيوان جاوز خمس سنوات مع ان ثناياه قليلة الذوبان وان نواجذه تدل على انه بلغ ست سنوات

والشكل الحادى عشر فلك حيوان اسنانه انمسحت انمساحا شديدا وذابت كلها وتباعد بعضها عن بعض وتلفت غاية التلف

والشكل الثانى عشر فلك حيوان كهل بلغ من العمر سبع عشرة

سنة فاكثر الى ثماني عشرة وذابت اسنانه حتى وصل الذوبان الى اعناق جذورها وصارت فضلات بيضاء مائلة الى الصفرة وتباعد بعضها عن بعض

بيان اللوح الرابع واشكاله

هذا اللوح مشتمل على ثلاثة عشر شكلا منها ستة مختصة باعمار الضأن من حين ولادته الى بلوغه خمس سنوات والسبعة الاشكال الباقية يعرف منها التغيرات التي تعتري اسنان الكلاب

فالشكل الاول فك شاة برزت جميع اسنانها اللبنية وصار قوسها السني مستديرا

والشكل الثاني فك شاة ثناياها البدلية معترضة وتم نموها ودلت على ان الشاة بلغت من العمر سنة ونصفا

والشكل الثالث فك شاة ايضا بلغت من العمر ثلاثين شهرا لوجود الاسنان الاربع القواطع البدلية اما الاربع الاسنان اللبنية الباقية فمنخفضة متخلخلة

والشكل الرابع يدل على ان الشاة بلغت من العمر اربع سنوات وهو مشتمل على ست اسنان بدلية

والشكل الخامس فك شاة اسنانها القواطع برزت وصارت مستديرة ودلت على ان الشاة بلغت من العمر خمس سنوات

والشكل السادس فك شاة امسحت جميع اسنانها القواطع ودلت على التقدم في العمر وصارت هيئتها كهيئة الخطاف المسمى عند العامة بعصفور الجنة لاسيما الثنايا

والشكل السابع فلك كلب صغير محتوعلى جميع اسنانه اللبنية (والاسنان القواطع والانياب) وبلغ من العمر شهرين او ثلاثة

والشكل الثامن فلك كلب آخر محتوعلى جميع اسنانه القواطع وانيابه اللبنية وانحرفت اسنانه القواطع كلها وتغيرت نوع تغير واشرفت على السقوط وكذلك الانياب ودل هذا الفلك على ان الكلب المذكور جاوز ثلاث سنوات

والشكل التاسع فلك كلب محتو على اسنانه القواطع وانيابه البدلية ولم تتغير ادنى تغير ولم تذب ويدل هذا الفلك على عشرة اشهر فاكثر الى سنة

والشكل العاشر فلك كلب بلغ من العمر خمسة عشر شهرا فاكثر الى ثمانية عشر لاتمساح اسنانه الثنايا السفلى اما ثناياه العليا فهى سلمية واما انيابه فبيضاء واضحة

والشكل الحادى عشر فلك كلب انمسحت ثناياه ورباعيته السفلى وبلغ من العمر سنتين ونصفا

والشكل الثانى عشر فلك كلب بلغ من العمر ثلاث سنوات فاكثر الى اربع

والشكل الثالث عشر فلك كلب جاوزست سنوات وتغيرت جميع اسنانه وتلفت نوع تلف وصارت الثنايا السفلى مخلخلة

وهاهنا تمت الرسالة بحمد الله وعونه على يد صحيح مسائلها وسقيم دلائلها الفقير الى رحمة ربه التواب مصطفى حسن كساب مع مترجمها من اللغة الفرنساوية الى اللغة العربية المترجم البارع محمد افندى عبد الفتاح رزقنا الله واياه

والمسلمين

والمسلمين حسن النجاح وقد وافق الفراغ منها يوم الاثنين
المبارك الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الاول من شهور
سنة ١٢٦٠ الف ومائتين وستين من
هجرة من له مزيد العز والشرف
سيدنا محمد عليه افضل
الصلاة والتسليم
آمين

م

طبع في مطبعة صاحب السعادة التي انشأها بولاق في اوائل
رجب الفرد سنة ١٢٦٠

(فهرست كتاب اعمار الحيوانات)

صحيفه

٢ ديباجة الكتاب
٣ الباب الاول فى عمر الفرس وفيه فصول
٤ الفصل الاول فى وصف الاسنان
٥ بيان الاسنان القواطع
١٠ الفصل الثانى فى الاضراس
١٣ الفصل الثالث فى الانياب ويقال لها الكلاليب
١٥ الفصل الرابع فى تركيب الاسنان
٢٣ الفصل الخامس فى العلامات التى يعرف بها عمر الحيوان
٣٩ بيان عمر الفرس من ابتداء خمس سنين لغاية اثنين وعشرين سنة
٤١ فصل فى الاختلافات المختصة بترتيب بروز وانمساح القواطع
٤١ بيان الفرس القبيح الفم من حيث اسنانه
٤٤ بيان الحيل التى تفعلها تجار الخيل ليغشوا بها مشتريها من حيث العمر
٤٧ الباب الثانى فى مقابلة عمر دوات الاربع بعمر الخيل وفيه فصول
٤٩ الفصل الاول فى اعمار البقر
٥٠ بيان الاسنان القواطع
٥٤ بيان بروز الاسنان ودوباتها
٥٥ بيان بروز وانمساح القواطع اللبنية

صحيفة

٥٧ بيان بروز وذوبان القطع البدلية
٦٠ بيان الاضراس
٦٢ بيان القرون الجبهيه
٦٧ كلام مجمل فى معرفة عمر البقر
٦٨ بيان تفصيل عمر البقر
٧٢ الفصل الثانى فى عمر الضأن
٧٣ بيان الاسنان القواطع
٧٤ بيان بروز وانمساح الاسنان
٧٨ بيان الاضراس
٧٩ بيان القرون
٨٢ كلام مجمل فى عمر الضأن
٨٣ الفصل الثالث فى عمر الكلاب
٨٥ بيان الاسنان القواطع والانياب
٨٧ بيان بروز وانمساح الاسنان القواطع والانياب
٩١ بيان الاضراس
٩٣ كلام مجمل فى عمر الكلاب
٩٥ الفصل الرابع فى عمر الخنزير
٩٦ بيان الاسنان القواطع والانياب
٩٩ بيان كيفية بروز وانمساح القواطع والانياب
١٠٠ بيان الاضراس
١٠١ كلام مجمل فى عمر الخنزير
١٠٢ تذييل فى بيان الواح الفكوك واشكالها

صحیفہ

۱۰۳ بیان اللوح الاول

۱۰۵ بیان اللوح الثانی واشکالہ

۱۰۷ بیان اللوح الثالث واشکالہ

۱۰۹ بیان اللوح الرابع واشکالہ


نگار ۱
نگار ۲
نگار ۳
نگار ۴
نگار ۵
نگار ۶
نگار ۷
نگار ۸
نگار ۹
ا
ب
ج
د
ہ




شكل ١
شكل ٢
شكل ٣
شكل ٤
شكل ٥
شكل ٦
شكل ٧
شكل ٨
شكل ٩
شكل ١٠
شكل ١١
شكل ١٢